

Fervex Junior, 8 saszetek



Cena: 22,46 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FERVEX
Opakowanie	8 saszetek
Postać	Saszetki
Producent	UPSA SAS
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Fervex Junior to preparat w formie granulatu do przygotowania roztworu doustnego, przeznaczony dla dzieci powyżej 6. roku życia. Posiada właściwości przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, wspomaga udrożnienie przewodów nosowych, redukuje odruch kichania oraz łzawienie oczu, a także uzupełnia niedobory witaminy C.

Wskazania

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dzieci powyżej 6. lat.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

- Dzieci od 6. do 10. lat: 1 saszетка 2 razy na dobę.
- Dzieci od 10. do 12. lat: 1 saszетка 3 razy na dobę.
- Młodzież od 12. do 15. lat: 1 saszетка 4 razy na dobę.

Skład

1 saszетка zawiera:

- substancje czynne: paracetamol 280 mg, kwas askorbowy 100 mg, maleinian feniraminy 10 mg,
- substancje pomocnicze: mannitol, kwas cytrynowy bezwodny, powidon, magnezu cytrynian bezwodny, acesulfam potasowy, aromat malinowy

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Fervex Junior, jeśli występuje:

- Nadwrażliwość (uczulenie) na substancje czynne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.
- Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.
- Jaskra z wąskim kątem.
- Rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu.
- Fenyloketonuria, ze względu na zawartość aspartamu.
- Nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy - galaktozy lub niedobór sacharazy - izomaltazy, ze względu na zawartość sacharozy w leku.

Działania niepożądane

Działania neurowegetatywne:

- uspokojenie lub senność, bardziej nasilone w początkowym okresie leczenia,
- objawy antycholinergiczne, takie jak suchość błon śluzowych, zaparcia, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, ryzyko zatrzymania moczu,
- niedociśnienie ortostatyczne,
- zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi, częściej u osób w wieku podeszłym,
- zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia,
- splątanie, omamy,
- rzadziej objawy o typie pobudzenia: niepokój ruchowy, nerwowość, bezsenność.

Ostrzeżenia

- Należy zachować ostrożność w przypadku podawania leku u osób z zaburzeniami czynności nerek.
- W przypadku chorych na cukrzycę należy uwzględnić obecność w leku cukru, którego zawartość wynosi 2,4 g w jednej saszetce.
- Lek zawiera aspartam, który jest przeciwwskazany w fenyloketonurii.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent

UPSA SAS
3, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, Francja