

Fervex malina, 12 saszetek



Cena: 28,66 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FERVEX
Opakowanie	12 saszetek
Postać	granulki
Producent	UPSA SAS
Przeznaczenie	Ból, Gorączka, Grypa
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Od 15 lat, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Fervex malinowy jest lekiem stosowanym do doraźnego leczenia objawów przeziębienia, grypy oraz stanów grypopodobnych u dzieci powyżej 15 roku życia oraz dorosłych. Jest to preparat leczniczy złożony, który zawiera trzy substancje czynne:

- Paracetamol: Ma działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, pomaga w łagodzeniu bólu mięśniowego, gardła, głowy oraz obniża gorączkę.
- Maleinian feniraminy: Pomaga zmniejszyć obrzęk i przekrwienie błon śluzowych nosa, co może przynieść ulgę w przypadku kataru.
- Kwas askorbinowy (witamina C): Uzupełnia niedobór witaminy C w organizmie, która może być zwiększona w czasie przeziębienia i grypy.

Wskazania

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, zmniejszające przekrwienie i obrzęk błon śluzowych.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 15 lat: 1 saszетка 2 lub 3 razy na dobę, z zachowaniem minimalnych 4-godzinnych przerw.

Skład

1 saszетка zawiera:

- substancje czynne: paracetamol 500 mg, kwas askorbinowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg;

- substancje pomocnicze: sacharoza (11,555g), kwas cytrynowy bezwodny, guma arabska, sacharyna sodowa i aromat malinowy.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
- Ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.
- Jaskry z wąskim kątem przesączania.
- Rozrostu gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu.
- Wiek poniżej 15 lat.
- Nietolerancji niektórych cukrów.

Działania niepożądane

Fervex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego pacjenta wystąpią. Poniżej przedstawiam możliwe działania niepożądane:

- Ostry atak jaskry, który może objawiać się wysokim ciśnieniem w oku, bólem oka i zamgleniem widzenia (ryzyko większe u pacjentów ze skłonnością do jaskry).
- Zaburzenia oddawania moczu.
- Uczucie suchości w ustach, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, zaparcia.
- Zaburzenia równowagi, pamięci lub koncentracji uwagi, zawroty głowy (częściej u osób w podeszłym wieku).
- Zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia.
- Splątanie, omamy.
- Niepokój ruchowy, nerwowość, bezsenność.
- Uspokojenie lub senność, szczególnie na początku leczenia.

Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich aktualnie stosowanych lekach, w tym również o lekach bez recepty. Należy być ostrożnym przy jednoczesnym stosowaniu Fervexu z następującymi lekami:

- Pochodne morfiny,
- Neuroleptyki,
- Barbiturany,
- Benzodiazepiny,
- Leki przeciwłękowe inne niż benzodiazepiny,
- Leki nasenne,

Ostrzeżenia

- Osoby w podeszłym wieku są bardziej narażone na wystąpienie zawrotów głowy, zaburzeń równowagi, zaburzeń pamięci, zaburzeń koncentracji uwagi.
- Stosując lek Fervex nie należy stosować innych leków zawierających paracetamol; osoby dorosłe o masie większej niż 50 kg nie powinny przyjmować więcej niż 4 gramy na dobę (4000 mg) paracetamolu.
- Zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby występuje u osób regularnie spożywających alkohol.
- Podczas przyjmowania leku Fervex nie należy spożywać alkoholu, leków zawierających alkohol oraz środków uspokajających.
- Lek zawiera sacharozę - należy wziąć to pod uwagę stosując dietę ubogocukrową i u osób z cukrzycą.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.