

Flavamed 30 mg, 20 tabletek

Cena: 17,51 zł



Opis słownikowy

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Dla kogo | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Marka | FLAVAMED |
| Opakowanie | 20 tabletek (2x10) |
| Postać | Tabletka |
| Producent | BERLIN CHEMIE AG |
| Przeznaczenie | Kaszel, Mokry kaszel |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty |
| Wiek | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów |

Opis produktu

Opis

Flavamed to lek przeciwkaszlowy i przeciwprzeziębieniowy stosowany w leczeniu mokrego kaszlu, który jest towarzyszem chorób dolnych dróg oddechowych, takich jak ostry i przewlekły stan zapalny płuc i oskrzeli. Jego działanie polega na rozrzedzaniu i ułatwianiu wykrztuszania gęstej wydzieliny. Standardowa kuracja Flavamedem trwa zazwyczaj od 4 do 5 dni

Wskazania

Leczenie mukolityczne w ostrych i przewlekłych schorzeniach oskrzeli i płuc, przebiegających z zaburzeniami wytwarzania i transportu śluzu.

Działanie

Rozrzedzanie śluzu w celu ułatwienia odkrztuszenia.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku 6 do 12 lat: ½ tabletki 2 do 3 razy na dobę (co odpowiada 15 mg ambroksolu chlorowodoru 2 – 3 razy na dobę). Maksymalna dawka dobową to 1½ tabletki (co odpowiada 45 mg ambroksolu chlorowodoru).
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: w czasie pierwszych 2 – 3 dni, 1 tabletkę 3 razy na dobę (co odpowiada 30 mg ambroksolu chlorowodoru 3 razy na dobę); następnie 1 tabletkę dwa razy na dobę (co odpowiada 30 mg ambroksolu chlorowodoru dwa razy na dobę). Maksymalna dawka dobową to 3 tabletki (co odpowiada 90 mg ambroksolu chlorowodoru).

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: chlorowodorek ambroksolu 30 mg,
- substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, skrobię kukurydzianą, celulozę (proszek), kroscarmelozę sodową, powidon K 30,

magnezu stearynian

Przeciwwskazania

Flavamed jest przeciwwskazany u osób z nadwrażliwością na substancję czynną (ambroksol) lub którąkolwiek substancję pomocniczą obecną w leku. Nie należy go stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, zaburzeniami czynności nerek i/lub ciężką niewydolnością wątroby. Pacjenci z astmą oskrzelową powinni stosować Flavamed ostrożnie, ponieważ lek może nasilać kaszel i powodować nadmierne odkrztuszanie. Istnieje również możliwość wystąpienia zastoju śluzu u pacjentów z zaburzoną motoryką oskrzelową.

Działania niepożądane

- nudności,
- wymioty, nudności, bóle brzucha,
- niestrawność,
- wysypka,
- pokrzywka,

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ostrzeżenia

- Lek Flavamed zawiera laktozę.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Przechowywać pojemnik wielodawkowy szczelnie zamknięty w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.