

# Flavamed 60 mg, 10 tabletek musujących

Cena: 16,99 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FLAVAMED
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	BERLIN CHEMIE AG
Przeznaczenie	Kaszel, Kaszel mokry
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Od 12 lat

## Opis produktu

### Opis

Lek Flavamed jest stosowany w leczeniu mokrego kaszlu związanego z chorobami płuc i oskrzeli.

### Wskazania

Leczenie mukolityczne w ostrych i przewlekłych schorzeniach oskrzeli i płuc, przebiegających z zaburzeniami wytwarzania i transportu śluzu.

### Działanie

Rozrzedzanie wydzieliny w celu ułatwienia odkrztuszenia.

### Dawkowanie

Standardowa dawka leku Flavamed dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia w ciągu pierwszych 2-3 dni to 1/2 tabletki trzy razy na dobę. Następnie dawkę można zmniejszyć do 1/2 tabletki dwa razy na dobę. Jeśli to konieczne, dawkę u dorosłych można zwiększyć do 1 tabletki dwa razy na dobę, ale nie należy przekraczać maksymalnej dawki. Lek należy przyjmować doustnie po posiłku, po rozpuszczeniu tabletki musującej w szklance zimnej lub ciepłej wody. Nie zaleca się stosowania leku bezpośrednio przed snem. Tabletkę można podzielić na połowy. Należy pamiętać, że lek Flavamed powinien być stosowany przez okres nie dłuższy niż 4-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

### Skład

1 tabletki musująca zawiera substancję czynną: 60mg chlorowodoru ambroksolu oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu węglan bezwodny, sacharyna sodowa, sodu cyklamian, sodu chlorek, sodu cytrynian, laktoza bezwodna, mannitol (E 421), sorbitol (E 420), aromat wiśniowy, symetykon.

### Przeciwwskazania

Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Flavamed w przypadku:



- Nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Dzieci poniżej 12. roku życia.
- Ciąża i karmienie piersią - lek może być stosowany tylko za wyraźnym zaleceniem lekarza.
- Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zaburzenia czynności nerek i/lub ciężka niewydolność wątroby - należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku.
- Astma oskrzelowa - Flavamed może nasilać kaszel i powodować nadmierne odkrztuszanie, dlatego należy stosować go ostrożnie.
- Zaburzona motoryka oskrzelowa - istnieje możliwość wystąpienia zastoju śluzu, dlatego należy stosować lek ostrożnie.

#### **Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.