

Flegamina Classic Junior o smaku truskawkowym 2 mg/5 ml syrop 120 ml



Cena: 17,88 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FLEGAMINA
Opakowanie	120 ml (butelka)
Postać	Syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Przeznaczenie	Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Flegamina Junior o aromacie truskawkowym to lek, który stosuje się w celu ułatwienia procesu oczyszczania oskrzeli poprzez działanie wykrztuśne.

Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Działanie

Działa wykrztuśnie, upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

Dawkowanie

- dzieci w wieku od 2. do 6. lat: 10ml syropu (2 łyżki miarowe) 2 razy na dobę;
- dzieci w wieku od 6. do 12. lat: 10ml (2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę;
- dorośli i dzieci w wieku powyżej 12. lat: 20ml syropu (4 łyżki miarowe) 3 razy na dobę.

Skład

5ml syropu zawiera substancję czynną: 2mg bromoheksyny chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, glukoza, metylu parahydroksybenzoesan, aromat truskawkowy, koszenila w postaci 7,5% roztworu barwnika, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Flegamina Junior:



- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na bromoheksynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u dzieci poniżej 2 lat (zawartość bromoheksyny w leku).

Działania niepożądane

- Niezbyt często występujące działania niepożądane: nudności, biegunka, wymioty, bóle w górnej części brzucha.
- Rzadko występujące działania niepożądane : wysypka, nadwrażliwość.

Ostrzeżenia

- Odpowiednie nawodnienie organizmu ułatwia upłynnienie wydzieliny i usunięcie jej z drzewa oskrzelowego.
- Stosować ostrożnie, jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy.
- W przypadku wystąpienia zmian skórnych lub na błonach śluzowych, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
- Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu - może powodować reakcje alergiczne (również typu późnego).
- Lek zawiera glukozę - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni.

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA
Emilii Plater 53
Warszawa