

Flonidan Control 10 mg Lek 10 sztuk

Cena: 13,69 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FLONIDAN
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	SANDOZ GMBH
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Flonidan Control to lek przeciwalergiczny w postaci tabletek, przeznaczony zarówno dla dorosłych, jak i dzieci powyżej 6 roku życia, o masie ciała co najmniej 30 kg.

Preparat jest stosowany w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zarówno sezonowego, jak i całorocznego. Objawy te mogą obejmować kichanie, wodnisty wyciek z nosa, świąd nosa, świąd podniebienia, a także świąd, zaczerwienienie lub łzawienie oczu. Ponadto Flonidan Control jest skuteczny w leczeniu przewlekłej pokrzywki o nieznannej przyczynie (idiopatycznej), która charakteryzuje się świądem skóry i występowaniem pokrzywki.

Głównym składnikiem aktywnym leku jest loratadyna, trójpierścieniowy lek przeciwhistaminowy. Jego działanie polega na częściowo wybiórczym oddziaływaniu na obwodowe receptory histaminowe H1, przy minimalnym przenikaniu do ośrodkowego układu nerwowego. Opakowanie Flonidan Control zawiera 10 białych, owalnych tabletek, z każdą z nich zawierającą 10 mg loratadyny.

Wskazania

Lek Flonidan Control 10 mg stosuje się od 6 roku życia (u osób o masie większej niż 30 kg):

- w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa,
- w leczeniu objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Działanie

Przeciwalergiczne, łagodzące objawy alergii.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (o masie ciała większej niż 30 kg): 1 tabletka (10 mg) raz na dobę.

Skład

1 tabletką zawiera:

- substancję czynną: loratadynę 10 mg,
- substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Flonidan Control:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na loratadynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u kobiet w ciąży.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane:

- ból głowy, nerwowość i uczucie zmęczenia (u dzieci),
- senność (u dorosłych i młodzieży).

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

- ból głowy, zwiększenie apetytu i zaburzenia snu (u dorosłych i młodzieży).

Ostrzeżenia

- Flonidan Control zawiera laktozę.
- W przypadku ciężkich zaburzeń wątroby, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

SANDOZ
Domaniewska 50c
Warszawa

Galeria

