

# Fluimucil MUKO gran. 200mg 20 saszetek



Cena: 13,87 zł

## Opis słownikowy

|                 |   |
|-----------------|---|
| Część ciała     | Drogi oddechowe                                     |
| Dla kogo        | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn               |
| Opakowanie      | 20 saszetek   |
| Postać          | granulki  |
| Producent       | ZAMBON SPA  |
| Przeznaczenie   | Kaszel, Kaszel mokry                                |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty                                     |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 7 lat |

## Opis produktu

### Opis

Jest to produkt leczniczy dostępny bez recepty (OTC) w postaci granulatu, który służy do sporządzania roztworu doustnego. Lek ten jest odpowiedni do krótkotrwałego stosowania u pacjentów z objawami zakażenia w górnych drogach oddechowych. Główną substancją czynną w tym leku jest acetylocysteina, która działa na rozrzedzenie śluzowo-ropnej wydzieliny oraz śluzu.

### Wskazania

Do krótkotrwałego stosowania u pacjentów z objawami infekcji w obrębie górnych dróg oddechowych w celu ich oczyszczenia, poprzez rozrzedzenie wydzieliny dróg oddechowych i ułatwienie jej odkrztuszenia.

### Działanie

Mukolityczne (upłynnia wydzielinę dróg oddechowych i ułatwia jej odkrztuszenie).

### Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 7 do 14 lat: 1 saszетка 2 razy na dobę.
- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 14 lat: 1 saszетка 2 do 3 razy na dobę.

### Skład

1 saszетка (1 g granulatu) zawiera:

- substancję czynną: acetylocysteina (Acetylcysteinum) 200 mg;
- substancje pomocnicze: aspartam, beta-karoten (zawiera sacharozę i mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu), aromat pomarańczowy (zawiera glukozę i laktozę), sorbitol.

### Przeciwwskazania

Należy pamiętać, że istnieją pewne przeciwwskazania i ograniczenia dotyczące stosowania tego leku. Nie należy go stosować w przypadku nadwrażliwości na dowolną substancję wchodzącą w skład leku, stanu astmatycznego oraz fenyloketonurii. Ważne jest również zauważyć, że ze względu na ilość substancji czynnej, lek Flumucil Muko 200 mg nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 7. roku życia.

Dodatkowo, należy unikać stosowania leku u dzieci poniżej 2. roku życia, ponieważ acetylocysteina może powodować niedrożność dróg oddechowych u dzieci w tej grupie wiekowej.

#### Działania niepożądane

- ból głowy,
- szum w uszach,
- tachykardia,
- wymioty, biegunka, ból brzucha, nudności,
- pokrzywka, wysypka,
- gorączka,
- obniżenie ciśnienia tętniczego,

#### Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Flumucil Muko jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, ponieważ może dojść do zalegania wydzieliny w wyniku zmniejszenia odruchu kaszlowego.

#### Ostrzeżenia

- Lek zawiera aspartam - źródło fenyloalaniny.
- Lek zawiera sacharozę.
- Lek zawiera glukozę i laktozę - nie stosować u pacjentów z nietolerancją niektórych cukrów.
- Lek zawiera sorbitol, który jest źródłem fruktozy.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.