

Forlax 10 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 20 saszetek

Cena: 28,01 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FORLAX
Opakowanie	20 saszetek
Postać	Saszetki
Producent	IPSEN CONSUMER HEALTHCARE
Przeznaczenie	Zaparcia
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 8 lat

Opis produktu

Opis

Forlax 10g to lek stosowany w leczeniu objawowym zaparc u dorosłych i dzieci powyżej 8. roku życia. Zawiera jako substancję czynną makrogol 4000, należy do grupy leków o działaniu osmotycznym. Działa poprzez zwiększenie zawartości wody w treści kałowej, co pomaga przywrócić prawidłową perystaltykę jelit. Importantly, Forlax nie jest wchłaniany do krwiobiegu i nie ulega metabolizmowi w organizmie.

Wskazania

Lek Forlax 10g stosuje się w objawowym leczeniu zaparc u dorosłych i u dzieci w wieku od 8 lat.

Działanie

Przeciszczające.

Dawkowanie

Dzieci powyżej 8 lat i dorośli: jedna - dwie saszetki na dobę, przyjmowane najlepiej w postaci jednej dawki rano.

Skład

1 saszetka zawiera:

- substancja czynna: makrogolu 4000 10g,
- substancje pomocnicze: sacharyna sodowa (E954), aromat pomarańczowo-grejpfrutowy (olejki: pomarańczowy i grejpfrutowy, skoncentrowany sok pomarańczowy, cytral, aldehyd octowy, linalol, etylu maślan, alfa-terpineol, oktanal, beta-gamma-heksenol, maltodekstryna, guma arabska, sorbitol, butylowany hydroksyanizol (E320) oraz dwutlenek siarki (E220)).

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na makrogol (glikol polietylenowy) lub którykolwiek z pozostałych składników,
- w przypadku zapalenia jelit,
- w przypadku perforacji jelit lub ryzyka wystąpienia perforacji jelit,
- w przypadku niedrożności jelita lub podejrzenia niedrożności jelit,
- w przypadku bólu brzucha o nieznanym przyczynie.

Działania niepożądane

- ból brzucha,
- biegunka, która może także powodować bolesność okolic odbytu.
- nudności (mdłości) lub wymioty,
- wzdęcie brzucha.

Ostrzeżenia

Forlax 10 g może czasami powodować biegunkę, dlatego przed jego przyjęciem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

- upośledzonej funkcji wątroby lub nerek,
- przyjmowania leków moczopędnych - możliwość wystąpienia większego ryzyka niskiego stężenia sodu lub potasu we krwi,
- osób w podeszłym wieku - może wystąpić zwiększone ryzyko niskiego stężenia sodu (soli) lub potasu we krwi.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.