

# Furaginum Hasco Max 100 mg, 30 tabletek

Cena: 17,29 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Infekcja, Zakażenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

**Furaginum Hasco Max** to preparat w postaci tabletek, zawierający furyzydynę, nazywaną również furaginą, jako substancję czynną. Furyzydyna, będąca pochodną nitrofuranu, działa hamująco na rozwój bakterii, które są odpowiedzialne za zakażenia dolnych dróg moczowych. Lek Furaginum Hasco Max jest stosowany w leczeniu ostrej oraz nawracającej postaci niepowikłanych infekcji dolnych dróg moczowych.

### Wskazania

Zakażenia dolnych dróg moczowych.

### Działanie

Lek Furaginum Hasco Max hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.

### Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 15 lat:

- pierwszy dzień leczenia: 100mg (1 tabletki) 4 razy na dobę;
- następane dni: 100mg (1 tabletki) 3 razy na dobę.

### Skład

1 tabletki zawiera:

- substancję czynną: 100mg furyzydyny
- substancje pomocnicze: skrobia żelowana, kukurydziana, sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy 50.

### Przeciwwskazania

Nie stosować u osób z nadwrażliwością na furyzydynę, pochodne nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest okres donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko wystąpienia u



noworodka niedokrwistości hemolitycznej (anemii związanej z rozpadem krwinek czerwonych). Leku nie podawać osobom ze stwierdzoną niewydolnością nerek czy polineuropatią.

#### Działania niepożądane

- Nudności,
- Nadmierne oddawanie gazów,
- Bóle głowy,

#### Ostrzeżenia

- Przy długotrwałym stosowaniu leku (6 miesięcy), należy wykonać badanie krwi (w celu kontroli liczby białych krwinek) oraz czynności nerek i wątroby.
- Zastosowanie leku skonsultować z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występują: zaburzenia czynności nerek, wątroby, zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witamin z grupy B, kwasu foliowego, gorączka, dreszcze, kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność.
- Lek zawiera sacharozę, 28 mg w 1 tabletkę, więc w przypadku pacjentów z nietolerancją niektórych cukrów przed zastosowaniem produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

#### Producent

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.  
ul. Żmigrodzka 242e  
51-131 Wrocław