

Groprinosin 250 mg/5 ml Syrop smak malinowy 150 ml



Cena: 24,56 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GROPRINOSIN
Opakowanie	150 ml
Postać	Syrop
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwwirusowe, Wspomaganie odporności, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

Groprinosin 250 mg/5 ml to syrop, który wykazuje właściwości przeciwwirusowe i wzmacniające odporność organizmu, stymulując jednocześnie funkcje układu odpornościowego.

Wskazania

- Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
- W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).
- Może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

Działanie

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): zalecana dawka dobową wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę), zwykle 3 g (czyli 60 ml syropu) na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeks na dobę (czyli 80 ml syropu/dobę).

Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia: zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/ kg masy ciała/dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby:

- dla dzieci o wadze 10 - 14 kg: 3 x 5 ml syropu*,
- dla dzieci o wadze 15 - 20 kg: 3 x 5 do 7,5 ml syropu,
- dla dzieci o wadze 21 - 30 kg: 3 x 7,5 do 10 ml syropu,
- dla dzieci o wadze 31 - 40 kg: 3 x 10 do 15 ml syropu,
- dla dzieci o wadze 41 - 50 kg: 3 x 15 do 17,5 ml syropu.

Skład

1 ml syropu zawiera:

- substancję czynną leku: inozyiny pranobeks (50 mg/ ml),
- pozostałe składniki: sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona, sacharyna sodowa, glicerol, etanol 96% oraz aromat malinowy L-144739 (cukier, glikol propylenowy, etanol, naturalna substancja zapachowa).

Przeciwwskazania

Nie stosować Groprinosinu Forte u osób z uczuleniem na inozyiny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania syropu jest napad dny moczanowej czy zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Działania niepożądane

- Bardzo często: zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi lub w moczu.
- Często: podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi, bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie lub złe samopoczucie, nudności z wymiotami lub bez, ból brzucha, świąd skóry, wysypka skórna (jako jedyny objaw), bóle stawów.

Ostrzeżenia

- Lek Groprinosin Forte zawiera metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, które mogą wywoływać reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
- Ze względu na to, że Groprinosin Forte zawiera maltitol, to jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Syrop może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu.
- Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 30 ml, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

Producent

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki