

# Groprinosin 500 mg Tabletki 50 sztuk

Cena: 56,16 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GROPRINOSIN
Opakowanie	50 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Infekcja, Obniżona odporność, Przeziębienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 1 roku życia

## Opis produktu

### Opis

**Groprinosin** to lek w postaci tabletek o działaniu przeciwwirusowym. Dodatkowo, ten preparat stymuluje aktywność układu odpornościowego, co pomaga zmniejszyć podatność na infekcje. Jego skuteczną substancją jest pranobeks inozylny, który działa poprzez hamowanie namnażania wirusów z grupy Herpes w testach laboratoryjnych. Groprinosin jest przeznaczony zarówno dla dorosłych, jak i dzieci powyżej roku życia.

Lek Groprinosin jest stosowany w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy, wywołanej przez wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Preparat może także być stosowany wspomagająco u osób z obniżoną odpornością oraz w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Warto zaznaczyć, że lek jest przeznaczony dla pacjentów, u których w przeszłości zostało zdiagnozowane zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

### Wskazania

- Leczenie opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).
- Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

### Działanie

Przeciwwirusowe.

### Dawkowanie

- Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): zalecana dawka to 50 mg/ kg masy ciała na dobę.
- Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia: zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych.

### Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną leku: inozyliny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3) 500 mg,
- pozostałe składniki: skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

#### Przeciwwskazania

Osoby uczulone na inozyliny pranobeks lub dowolny z pozostałych składników tego leku nie powinny go stosować. Dodatkowo, jeśli pacjent aktualnie przeżywa napad dny moczanowej, który charakteryzuje się silnym bólem stawów, obrzękiem i zaczerwienieniem skóry, lub wyniki badań wykazują zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi, również nie zaleca się stosowania tego preparatu.

#### Działania niepożądane

- przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi,
- podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi,
- nudności z wymiotami lub bez,
- ból brzucha,
- swędzenie skóry,
- wysypka skórna (jako jedyny objaw),
- bóle głowy,
- zawroty głowy,
- zmęczenie lub złe samopoczucie,
- bóle stawów.

#### Ostrzeżenia

Jeśli nie zaobserwuje się poprawy lub pacjent czuje się gorzej w ciągu 5-14 dni stosowania, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem. Ostrożność powinna być zachowana przy stosowaniu Groprinosinu u pacjentów z wcześniejszymi epizodami dny moczanowej, podwyższonym poziomem kwasu moczowego, kamieniami nerkowymi oraz u osób z zaburzeniami funkcji nerek. W przypadku długotrwałego stosowania (3 miesiące i dłużej), istnieje ryzyko tworzenia się kamieni nerkowych, dlatego ważne jest regularne monitorowanie stanu krwi, nerek i wątroby pod nadzorem lekarza. Jeśli wystąpią objawy reakcji alergicznej, takie jak wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka, leczenie należy natychmiast przerwać i skonsultować się z lekarzem. Lek należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci, chroniąc go przed światłem i wilgocią.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.