


# Groprinosin Forte syrop 500mg/5ml 150ml



Cena: 33,70 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GROPRINOSIN
Opakowanie	150 ml (but.)
Postać	Syrop
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwwirusowe, Wspomaganie odporności, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 1 roku życia

## Opis produktu

### Opis

**Groprinosin Forte** to syrop o smaku malinowym, który działa przeciwwirusowo i dodatkowo stymuluje aktywność układu odpornościowego, wzmacniając zdolność organizmu do zwalczania infekcji. Głównym składnikiem czynnym leku jest inozyna w formie pranobeksu, która wykazuje zdolność hamowania namnażania wirusów z rodziny Herpes w warunkach laboratoryjnych.

### Wskazania

- Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w sytuacji nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
- Leczenie opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

### Działanie

Przeciwwirusowe i immunostymulujące.

### Dawkowanie

Dorośli, w tym osoby powyżej 65 lat: zwykle 30 ml/ 3 g syropu na dobę (50 mg/ kg masy ciała na dobę/ 0,5 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę), podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych.

Dzieci powyżej 1 roku życia: w zależności od masy ciała (50 mg/kg masy ciała na dobę/ 0,5 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby:

- 10-14 kg: 3 x 2,5 ml,
- 15-20 kg: 3 x 2,5-3,5 ml,
- 21-30 kg: 3 x 3,5-5 ml,
- 31-40 kg: 3 x 5-7,5 ml,

- 41-50 kg: 3 x 7,5-9 ml.

#### Skład

1 ml syropu zawiera:

- substancję czynną: inozyny pranobeks 100 mg,
- pozostałe składniki: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), maltitol ciekły (E 965) (maltitol, sorbitol), sacharyna sodowa (E 954), sukraloza (E 955), sodu wodorotlenek, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona, aromat malinowy L-144739 (cukry, glikol propylenowy, etanol, naturalne substancje aromatyzujące) oraz aromat malinowy 10721-31 (dietylu malonian, etylu octan, aldehyd octowy, trans-2 heksanal,  $\beta$ -Damascenon, maltodekstryna skrobiowa, guma arabska).

#### Przeciwwskazania

Nie stosować Groprinosinu Forte u osób z uczuleniem na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania syropu jest napad dny moczanowej czy zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

#### Działania niepożądane

- Często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, bóle głowy i/lub zawroty głowy, zmęczenie lub złe samopoczucie, nudności z możliwymi wymiotami i/lub dyskomfort w nadbrzuszu, świąd skóry, wysypka skórna (jako jedyny objaw), bóle stawów.
- Niezbyt często: senność lub trudności w zasypianiu, biegunka, zaparcia, wielomocz (zwiększona ilość wydalanego moczu), nerwowość.

#### Ostrzeżenia

- Lek Groprinosin Forte zawiera metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, które mogą wywoływać reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
- Ze względu na to, że Groprinosin Forte zawiera maltitol, to jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Syrop może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu.
- Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 30 ml, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

#### Producent

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5  
05-825 Grodzisk Mazowiecki