

Gynoxin Optima, 3 kapsułki dopochwowe

Cena: 39,76 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Marka	GYNOXIN
Opakowanie	3 kapsułki
Postać	Kapsułka
Producent	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A
Przeznaczenie	Grzybica, Stan zapalny, Upławy
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 16 lat

Opis produktu

Opis

Gynoxin Optima to lek dostępny w postaci miękkich kapsułek dopochwowych, stosowany w leczeniu grzybiczego zapalenia pochwy i sromu, znanej również jako drożdżycę pochwy i sromu, oraz w leczeniu zakażeń mieszanych pochwy. Lek Gynoxin skutecznie eliminuje objawy i leczy infekcję intymną w ciągu 3 dni. Jego substancją czynną jest fentikonazol, który wykazuje działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne. Każda kapsułka zawiera 200 mg azotanu fentikonazolu. Produkt jest przeznaczony do stosowania u kobiet od 16. roku życia, jednak pacjentki powyżej 60. roku życia powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Wskazania

- Grzybicze zapalenie pochwy i sromu nazywane też drożdżycą pochwy i sromu.
- Leczenie zakażeń mieszanych pochwy.

Działanie

Przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne.

Dawkowanie

Zwykle stosowana dawka leku Gynoxin Optima to 1 kapsułka dopochwowa stosowana raz na dobę przez trzy kolejne dni. Aplikować głęboko do pochwy wieczorem przed snem.

Skład

1 kapsułka zawiera:

- substancję czynną: 200 mg azotanu fentikonazolu,
- substancje pomocnicze: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna,



żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E171), etylu parahydroksybenzoesan (E215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E217).

Przeciwwskazania

Leku Gynoxin Optima nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników.

Działania niepożądane

- Odczuwanie pieczenia sromu i pochwy, rumień, świąd, wysypka.

Ostrzeżenia

Stosowanie leku należy omówić z lekarzem jeśli u pacjentki wystąpił którykolwiek z poniższych objawów:

- nieprawidłowe lub nieregularne krwawienia,
- upławy zabarwione krwią,
- rany pochwy i sromu w tym owrzodzenia i pęcherze,
- ból w dolnej części brzucha oraz ból przy oddawaniu moczu,
- działania niepożądane takie jak podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk, które są związane z leczeniem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
Via Civitali 1
20148 Mediolan, Włochy