

Hedussin Syrop wykrztuśny dla dzieci i dorosłych 100 ml



Cena: 17,04 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HEDUSSIN
Opakowanie	100 ml (but.)
Postać	Syrop
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Przeznaczenie	Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Hedussin to lek roślinny, który jest używany jako środek wykrztuśny. Produkt ten jest przeznaczony do łagodzenia kaszlu produktywnego, zwłaszcza kaszlu mokrego, który charakteryzuje się utrudnionym odkrztuszaniem gęstej, zalegającej wydzieliny.

Wskazania

Środek wykrztuśny w kaszlu produktywnym (tzw. kaszel mokry) u dzieci od 2 lat i dorosłych.

Działanie

Wykrztuśne.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku 2-5 lat: 2 ml 2 razy na dobę.
- Dzieci w wieku 6-12 lat: 4 ml 2 razy na dobę.
- Dzieci i młodzież w wieku powyżej 12 lat oraz dorośli: 6 ml 2 razy na dobę.

Skład

1 ml syropu zawiera:

- substancję czynną: 8,25 mg suchego wyciągu z liści bluszczu (*Hederahelix L., folium*) (4-8:1); ekstrahent: etanol 30% (m/m),
- substancje pomocnicze: sorbitol ciekły (niekrystalizujący) (E420), potasu sorbinian (E202), guma ksantan (E415), kwas cytrynowy bezwodny (E330), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hedussin:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynną - suchy wyciąg z liści bluszczu, na inne rośliny z rodziny Araliaceae (rodzina botaniczna bluszczu) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u dzieci poniżej 2 lat - ryzyko pogorszenia się objawów ze strony układu oddechowego.

Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane: biegunka, nudności, wymioty.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane: pokrzywka, rumień, duszność, wysypka skórna.

Ostrzeżenia

- Możliwa jest obecność osadu w leku (przez zawartość składnika roślinnego).
- Jeśli podczas stosowania Hedussin wystąpi gorączka, duszność, ropna płwocina, należy skontaktować się z lekarzem.
- Lek można samodzielnie stosować 7 dni, w przypadku utrzymujących się objawów lub ich nasilenia, należy zwrócić się do lekarza o poradę.
- Lek ma działanie wykrztuśne, stąd nie powinien być przyjmowany z lekami hamującymi odruch kaszlowy (lekami o działaniu przeciwkaszlowym, np. kodeina, dekstrometorfan).
- Jeśli u pacjenta występuje zapalenie błony śluzowej żołądka lub choroba wrzodowa żołądka, należy ostrożnie stosować lek.
- W przypadku dzieci 2-4 lata z utrzymującym się lub nawracającym kaszlem, stosowanie leku Hedussin należy omówić z lekarzem.
- Lek zawiera sorbitol - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze do 25oC.
- Po pierwszym otwarciu lek należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Producent

PHYTOPHARM

Kłęka 1

Nowe Miasto nad Wartą

Galeria

