


Helicid Control 10 mg, 28 kapsułek

Cena: 19,35 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HELICID
Opakowanie	28 kapsułek
Postać	Kapsułka
Producent	ZENTIVA K.S.
Przeznaczenie	Nadkwaśność, Refluks, Wrzody, Zgaga
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Lek **Helicid Control** zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol, należącą do grupy leków zwanych "inhibitorami pompy protonowej". Te leki mają zdolność zmniejszania produkcji kwasu solnego w żołądku. Helicid Control jest stosowany u pacjentów dorosłych w celu krótkotrwałego łagodzenia objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak zgaga i cofanie się kwaśnej treści żołądkowej do przełyku. Refluks oznacza cofanie się kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić do stanów zapalnych i bólu. Objawy refluksu mogą obejmować uczucie pieczenia w klatce piersiowej, które promieniuje ku gardłu (zgaga), a także kwaśny smak w ustach.

Wskazania

U dorosłych: choroba refluksowa przełyku (ang. gastroesophageal reflux disease, GERD). Polega ona na tym, że kwas z żołądka przedostaje się do przełyku (rury łączącej gardło z żołądkiem), co powoduje ból, stan zapalny oraz zgagę. Owrzodzenia górnego odcinka jelita cienkiego (wrzody dwunastnicy) lub żołądka (wrzody żołądka). Owrzodzenie zakażone bakteriami nazywanymi "Helicobacter pylori". W takiej sytuacji lekarz może przepisać również antybiotyk w celu wyleczenia zakażenia i umożliwienia wygojenia wrzodów. Owrzodzenia spowodowane przez leki określane jako NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne). Lek może być stosowany także w celu zapobiegania rozwojowi owrzodzeń podczas przyjmowania NLPZ. Zbyt duża ilość kwasu w żołądku będąca skutkiem obecności zmiany rozrostowej w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona)

Działanie

Zmniejszanie ilości kwasu wydzielanego w żołądku.

Dawkowanie

Dorośli: 2 kapsułki po 10 mg raz na dobę przez 14 dni.

Skład

1 kapsułka zawiera: 10mg omeprazolu (w postaci soli sodowej omeprazolu) oraz substancje pomocnicze: sacharoza ziarenka, laktoza bezwodna, hypromelaza, hydroksypropylceluloza, sodu laurylosiarczan, disodu fosforan dwunastowodny, trietylu cytrynian, talk, kwasu metakrylowego-etylu akrylanu kopolimer (1:1). Skład otoczki: żelaza tlenek czarny, żelaza tlenek czerwony, tytanu dwutlenek, żelaza



tlenek żółty, żelatyna.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Helicid Control:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, ezomeprazol);
- jeżeli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Działania niepożądane

- ból głowy,
- wpływ na żołądek lub jelita: biegunka, ból żołądka, zaparcia, gazy (wzdęcia), łagodne polipy żołądka,
- nudności lub wymioty.