

Hirudoid Maść 40 g

Cena: 25,21 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HIRUDOID
Opakowanie	40 g
Postać	Maść
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące)
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Maść **Hirudoid** znajduje zastosowanie w leczeniu obrażeń, zarówno tych z krwiakami, jak i bez krwiałków.

Wskazania

Tępe urazy z krwiakami lub bez krwiałków, zapalenie żył powierzchownych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym.

Działanie

Przeciwwkrzepowe- polisiarczan mukopolisacharydowy działa przeciwwkrzepowo poprzez wpływ na koagulację i układ fibrynolityczny. Przeciwzapalne - składnik aktywny preparatu działa przeciwzapalnie hamując aktywność enzymów katabolicznych i syntezę prostaglandyn oraz ma działanie regeneracyjne - polisiarczan mukopolisacharydowy ułatwia regenerację tkanki łącznej poprzez aktywację syntezy komórek mezenchymalnych i poprawę zdolności wiązania wody przez istotę międzykomórkową.

Dawkowanie

Lek Hirudoid należy nakładać 2 do 3 razy na dobę na miejsca zmienione chorobowo lub, jeśli zachodzi potrzeba, częściej. W zależności od wielkości leczonej powierzchni zazwyczaj wystarcza nałożenie od 3 do 5 cm maści. Hirudoid w postaci maści należy wmasować w miejsca zmienione chorobowo. W przypadku bolesnego zapalenia, maść należy delikatnie rozprowadzić na miejsca chorobowo zmienione. Hirudoid maść może być używany jako opatrunek z maści.

Skład

100g maści zawiera substancje czynne: polisiarczan mukopolisacharydowy 0,3g/100g co odpowiada 25 000j.*; substancje pomocnicze: glicerol 85%, 4-hydroksybenzoesan metylu, 4-hydroksybenzoesan propylu, kwas stearynowy, podłoże maściowe z alkoholami lanoliny, alkohol cetosterylowy emulgujący, alkohol mirystylowy, alkohol izopropylowy, potasu wodorotlenek, tymol, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hirudoid:

- jeśli występuje nadwrażliwość (uczulenie) na polisiarczan mukopolisacharydowy, 4-hydroksybenzoesan metylu, 4-hydroksybenzoesan propylu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
- nie należy nakładać maści na otwarte rany i uszkodzoną skórę.

Ostrzeżenia

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

STADA
Al. 3 Maja 6
Piaseczno

Galeria

