

Hitaxa fast 5 mg, 10 tabletek



Cena: 14,44 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HITAXA
Opakowanie	10 tabletek
Postać	, Tabletka
Producent	ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.
Przeznaczenie	Przeciwałergiczne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Hitaxa Fast to lek przeciwałergiczny, który nie wywołuje uczucia senności. Jest skuteczny w kontroli reakcji alergicznej oraz łagodzeniu jej objawów. Hitaxa Fast dedykowany jest do łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych. Te objawy obejmują kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia, a także swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Wskazania

Lek przeciwałergiczny łagodzący objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką jak katar, łzawienia, kichanie, swędzenie i zaczerwienienie oczu, świąd podniebienia, świąd skóry.

Działanie

Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 roku życia: 1 tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej 1 raz na dobę.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- Substancję czynną: desloratadynę w dawce 5 mg;
- Substancje pomocnicze: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E172), magnezustearnian, kroscarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti, płynny (zawiera również glikol propylenowy), aspartam (E951), celuloza mikrokryształiczna, mannitol (suszony rozpyłowo) potasu wodorowęglan (do ustalenia pH).

Przeciwwskazania



Kiedy nie stosować leku Hitaxa fast:

- jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na loratadynę.

Działania niepożądane

Często : zmęczenie, suchość w jamie ustnej, ból głowy.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów): ciężkie reakcje alergiczne, szybkie bicie serca, wymioty, zawroty głowy, bóle mięśni,

Ostrzeżenia

- Lek Hitaxa fast występuje w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku Hitaxa fast należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek bądź występują drgawki.
- Lek Hitaxa fast zawiera aspartam, może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Adamed Pharma S.A.
Pieńków ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów