

Hitaxa Fast junior 2,5 mg, 10 tabletek

Cena: 15,66 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HITAXA
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.
Przeznaczenie	Przeciwałergiczne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Hitaxa Fast Junior to lek w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Preparat zawiera desloratadynę, która działa przeciwhistaminowo. Produkt jest przeznaczony do stosowania u dzieci powyżej 6. roku życia, młodzieży oraz dorosłych. Hitaxa Fast Junior ułatwia kontrolę reakcji alergicznej i łagodzi jej objawy, takie jak kichanie, swędzenie, wydzielina z nosa, a także swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu. Tabletki mogą być stosowane w przypadku alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, spowodowanego katarzem siennym lub uczuleniem na roztocza, a także w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką, tj. stanem skóry wywołanym uczuleniem, który objawia się m.in. świądem skóry. Ważne jest, że Hitaxa Fast Junior jest lekiem przeciwałergicznym, który nie powoduje senności, a działanie łagodzące objawy alergii utrzymuje się przez cały dzień, umożliwiając powrót do normalnego życia codziennego.

Wskazania

Łagodzenie objawów związanych z:

- alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa takich jak kichanie, swędzenie lub wydzielina z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu,
- pokrzywką.

Działanie

Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej: 2 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej raz na dobę.
- Dzieci w wieku 6-11 lat: 1 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej raz na dobę.



Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję aktywną: desloratadynę 2,5 mg,
- pozostałe składniki: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E172), magnezu stearynian, kroscarmeloza sodowa, aromat Tutti frutti, płynny (zawiera również glikol propylenowy), aspartam (E951), celuloza mikrokrystaliczna, mannitol (suszony rozpyłowo), potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hitaxa fast junior:

- jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, lub na loratadynę.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, pokrzyka i obrzęk, wysypka, kołatanie serca, szybkie bicie serca, bóle brzucha, nudności, wymioty, rozstrój żołądka, zawroty głowy, senność.

Ostrzeżenia

- Lek Hitaxa fast junior w postaci tabletek ulegają rozpadowi w jamie ustnej.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku Hitaxa fast junior należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, bądź występują drgawki.
- Lek zawiera aspartam, może być szkodliwy dla osób z fenylketonurią.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. Adamkiewicza 6
05-152 Czosnów