

HydroVag, globulki dopochwowe, 7 sztuk

Cena: 33,87 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Marka	HYDROVAG
Opakowanie	7 globulek
Postać	Globulki
Producent	INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED S.A.
Przeznaczenie	Ból, Podrażnienie, Stan zapalny, suchość, Uplawy
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

HydroVag to wyrób medyczny w postaci globulek dopochwowych stworzony specjalnie dla kobiet. Wspiera regenerację nabłonka pochwy, łagodzi uczucie suchości, oraz redukuje dyskomfort związany z świądem, pieczeniem i napięciem. Globulki mogą być stosowane wspomagająco dla utrzymania zdrowej flory bakteryjnej i optymalnego pH pochwy, zwłaszcza po antybiotykoterapii, po porodzie czy po zabiegach ginekologicznych. Zalecane są także w przypadku atrofii i dystrofii spowodowanej niedoborem estrogenów, w okresie okołomenopauzalnym, po leczeniu hormonalnym, a także po radio- i chemioterapii. Dodatkowo, mogą być stosowane w sytuacjach bolesnych stosunków w celu złagodzenia bólu.

Działanie

Globulki dopochwowe HydroVag

- tworzą warstwę powlekającą błony śluzowe, co korzystnie wpływa na proces regeneracji nabłonka pochwy;
- hialuronian sodu chroni i nawilża śluzówkę pochwy oraz wspiera proces gojenia i odbudowy tkanek;
- kwas mlekowy wspomaga utrzymanie właściwego pH pochwy, co zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji;
- glikogen jest składnikiem odżywczym dla pałeczek kwasu mlekowego oraz pełni funkcję barierową.

Dawkowanie

- Kuracja podstawowa: 1 globulka dopochwowa na noc przez kolejne 7 dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Kuracja podtrzymująca: 1 globulka dopochwowa na noc co 2-3 dni do uzyskania trwałej poprawy lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Składniki

1 globulka dopochwowa zawiera: 10 mg hialuronianu sodu, glikogen, kwas mlekowy oraz substancje pomocnicze: mleczan sodu i



glicerydy półsyntetyczne.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
- W przypadku ostrej infekcji pochwy zalecane jest stosowanie globulek pod nadzorem lekarza.
- Nie stosować w trakcie menstruacji.
- Bezpośrednio po aplikacji globulki nie podejmować współżycia płciowego.
- Nie stosować łącznie z prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi wykonanymi z lateksu ze względu na obecność w składzie preparatu modyfikowanych tłuszczów.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia blistra.
- Nie połykać.

Producent

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
Al. Sosnowa 8
30-224 Kraków