

## Ibufen 200 mg, 5 czopków

Cena: 19,03 zł



### Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	IBUFEN
Opakowanie	5 sztuk
Postać	Czopek
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 6 lat

### Opis produktu

#### Opis

**Ibufen** to lek przeciwzapalny dostępny w formie czopków, charakteryzujący się działaniem przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6. roku życia, młodzieży i dorosłych w sytuacjach gorączki, na przykład w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych. Czopki są zalecane, gdy pacjent nie może przyjąć leku doustnie lub występują u niego problemy z wymiotami.

#### Wskazania

Lek dla dzieci od 6 roku życia w przypadku gorączki różnego pochodzenia między innymi:

- w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych.

#### Działanie

- przeciwbólowe,
- przeciwgorączkowe,
- przeciwzapalne.

#### Dawkowanie

- Dzieci 6-9 lat (20-29 kg): 1 czopek 3 razy na dobę;
- Dzieci 10-12 lat (30-39 kg): 1 czopek 4 razy na dobę;
- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (powyżej 40 kg): 1-2 czopki w razie potrzeby co 4-6 godzin

## Skład

1 czopek zawiera:

- substancję czynną: 200 mg ibuprofenu
- substancje pomocnicze: Witepsol H15, Witepsol W45.

## Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Ibufen Junior:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Ibufen Junior
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ)
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby, nerek, chorobę wieńcową lub niewydolność serca
- jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi
- jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów)
- nie podawać dzieciom o masie ciała poniżej 20 kg

## Działania niepożądane

- Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha i nudności oraz miejscowe podrażnienie odbytu, bóle głowy, wysypki skórne różnego typu lub pokrzywka i świąd.
- Rzadko: zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie i uczucie zmęczenia, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, wymioty.

## Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

## Producent

POLPHARMA SA  
Pelplińska 19  
83-200 Starogard Gdański

## Galeria

