

Ibum dla dzieci 60 mg, 10 czopków

Cena: 19,75 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	IBUM
Opakowanie	10 czopków
Postać	Czopki
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przewodzące, Przewodzące
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 3 miesiąca życia

Opis produktu

Opis

Czopki dla dzieci **Hasco-Lek Ibum 60 mg** to preparat zawierający ibuprofen, substancję z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Posiada właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe. Preparat jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania.

Wskazania

Stany gorączkowe różnego pochodzenia między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia, a także w przebiegu odczynu poszczepiennego. Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego takie jak: bóle głowy, gardła i mięśni, bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania, bóle stawów i kości na skutek urazów narządów ruchu (np. skręcenia), bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

Działanie

Lek Ibum dla dzieci w czopkach wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz przeciwzapalne.

Dawkowanie

- Dzieci od 3 do około 9 miesięcy (6 kg do 8 kg): dawka początkowa to 1 czopek (60 mg), w razie potrzeby kolejny 1 czopek po 6 do 8 godzinach (nie należy stosować więcej niż 3 czopki, czyli 180 mg na dobę).
- Dzieci od 9 miesięcy do 2 lat (8 kg do 12,5 kg): dawka początkowa to 1 czopek (60 mg), w razie potrzeby kolejny 1 czopek po 6 godzinach (nie należy stosować więcej niż 4 czopki, czyli 240 mg na dobę).

Skład

1 czopek zawiera:

- substancję czynną; 60mg ibuprofenu,
- substancje pomocnicze: Witepsol S58.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
- Czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy.
- Perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ.
- Historia jakichkolwiek objawów alergii w reakcji na leczenie kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w szczególności w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej.

Działania niepożądane

- Często: zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia.
- Niezbyt często: zapalenie żołądka, jelita grubego i nasilenie choroby Crohna (zapalna choroba jelit), bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie, zaburzenia widzenia, wrzody żołądka, które mogą krwawić lub pękać, owrzodzenie jamy ustnej i/lub obrzęk i podrażnienie ust, reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem, ataki astmy (z możliwym spadkiem ciśnienia krwi).
- Rzadko: szumy uszne (dzwonienie w uszach).

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ibum dla dzieci należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli: pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe z grupy NLPZ lub kwas acetylosalicylowy, u pacjenta stwierdzono niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy, mieszaną chorobę tkanki łącznej), u pacjenta stwierdzono choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego i Crohna), u pacjenta stwierdzono podwyższone ciśnienie krwi i (lub) zaburzenia czynności serca, u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek, u pacjenta stwierdzono choroby wątroby, pacjent ostatnio przeżył poważną operację, jeśli u pacjenta występuje odwodnienie ze względu na zwiększone ryzyko niewydolności nerek, stwierdzono zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia), u pacjenta w przeszłości lub obecnie występuje astma, pacjent ma przewlekły katar, polipy nosa lub choroby alergiczne.

Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane (3 dni). W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy skonsultować to z lekarzem.

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław