

Ibuprom dla Dzieci Forte 100 ml



Cena: 30,16 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	IBUPROM
Opakowanie	100 ml
Postać	Zawiesina
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 3 miesiąca życia

Opis produktu

Opis

Ibuprom dla Dzieci Forte to lek w postaci płynu, przeznaczony do stosowania u niemowląt, dzieci i dorosłych w przypadku bólu i gorączki z różnych przyczyn, również w zakażeniach wirusowych lub reakcjach poszczepiennych. Lek jest zalecany w przypadku bólu o słabym do umiarkowanego nasileniu, takiego jak bóle głowy, zębów, gardła, mięśni, stawów i kości. Może być również stosowany przy bólu wynikającym z urazów narządu ruchu, ząbkowania, po zabiegach stomatologicznych oraz w przypadku bólu ucha związanego z zapaleniem ucha środkowego.

Ibuprom dla Dzieci Forte, o smaku truskawkowym, zawiera ibuprofen jako substancję czynną, należącą do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek ten posiada działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne, wpływając na zmianę odpowiedzi organizmu na ból, stan zapalny i podwyższoną temperaturę ciała.

Wskazania

Lek jest przeznaczony do stosowania u niemowląt od 3 miesiąca życia, dzieci i dorosłych w przypadku:

- gorączki różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego),
- bóli różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń wirusowych; bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwyrężenia, skręcenia); bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne; bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania; bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

Działanie

Przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

- Niemowlęta od 3 do 6 miesięcy (5 - 7,6 kg): 3 razy po 1,25 ml w ciągu doby (co odpowiada 150 mg ibuprofenu na dobę).
- Niemowlęta od 6 do 12 miesięcy (7,7 - 9 kg): 3 do 4 razy po 1,25 ml w ciągu doby (co odpowiada 150 - 200 mg ibuprofenu na dobę).
- Dzieci od 1 do 3 lat (10 - 15 kg): 3 razy po 2,5 ml w ciągu doby (co odpowiada 300 mg ibuprofenu na dobę).
- Dzieci od 4 do 6 lat (16 - 20 kg): 3 razy po 3,75 ml w ciągu doby (co odpowiada 450 mg ibuprofenu na dobę).
- Dzieci od 7 do 9 lat (21 - 29 kg): 3 razy po 5 ml w ciągu doby (co odpowiada 600 mg ibuprofenu na dobę).
- Dzieci od 10 do 12 lat (30 - 40 kg): 3 razy po 7,5 ml w ciągu doby (co odpowiada 900 mg ibuprofenu na dobę).
- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: dawką rekomendowaną w objawowym leczeniu bólu i gorączki jest 3 razy po 10 ml w ciągu doby, do ustąpienia objawów.

Skład

1 ml zawiesiny doustnej zawiera:

- substancję czynną: 40 mg ibuprofenu,
- substancje pomocnicze: sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, sacharyna sodowa, sodu chlorek, hypromeloza 15 cP, guma ksantan, maltitol ciekły, glicerol, taumatyna (E 957), aromat truskawkowy (zawiera substancje identyczne z naturalnymi aromatami, naturalne aromaty, maltodekstrynę, cytrynian trietylu, glikol propylenowy i alkohol benzylowy), woda oczyszczona

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Ibuprom dla dzieci Forte:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
- u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej,
- u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy czynną lub przebytą, perforacją lub krwawieniem, również z innymi występującymi po zastosowaniu NLPZ,
- u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca,
- u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych),
- ze skazą krwotoczną.

Działania niepożądane

- Występujące często: zgaga, ból brzucha, nudności i niestrawność, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia.
- Występujące niezbyt często: zapalenie żołądka, jelita grubego i nasilenie choroby Leśniowskiego-Crohna, ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, zmęczenie, zaburzenia widzenia, wrzody żołądka, które mogą krwawić lub pękać, owrzodzenie jamy ustnej i (lub) obrzęk i podrażnienie skóry; reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem, ataki astmy (z możliwym spadkiem ciśnienia krwi).
- Występujące rzadko: szumy uszne (dzwonienie w uszach).

Ostrzeżenia

- Lek Ibuprom dla Dzieci zawiera maltitol ciekły i sól Lek zawiera maltitol ciekły. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Lek zawiera 2,74 mg/ml sodu, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.
- Po pierwszym otwarciu lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Producent

US PHARMACIA
Ziębicka 40
Wrocław