APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Ibuprom Sport żel Lek przeciwbólowy przeciwzapalny 60 g

Cena: 21,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	60 g (tub.)
Postać	-
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.

Opis produktu

Składniki
100 g żelu zawiera: 5 g ibupforenu oraz substancje pomocnicze: etanol 96%, alkohol izopropylowy, hydroksyetyloceluloza, lewomentol, aromat Reflex 12122 (metylu salicylan), glikolu dietylenowego monoetylowy eter, makrogologlicerydów kaprylokaproniany (Makrogol 400), glicerol, sodu wodorotlenek (10% roztwór wodny), woda oczyszczona

Stosowanie
Dawkowanie i droga podawania
Do stosowania miejscowego, na skórę. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Opis
buprom Sport żel to przeciwbólowy i przeciwzapalny lek przeznaczony do miejscowego stosowania na skórę. Ma lekko żółtawe zabarwienie i charakterystyczny zapach. Zawiera ibuprofen - substancję czynną, która działa na zmiany zapalne w tkance, przyczyniając się do hamowania syntezy prostaglandyn. Ibuprofen zaliczany jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Żel Ibuprom Sport wcierany miejscowo w skórę leczy bóle mięśni oraz bóle występujące w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów obwodowych i kręgosłupa. Może być również stosowany w leczeniu zmian powypadkowych lub pourazowych związanych z uprawnianiem sportu (np. stłuczeń, skręceń), zmian zapalnych tkanek okołostawowych oraz w leczeniu bolesnej sztywności barku i bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa.

Wskazania

- Miejscowe leczenie bólów mięśni.
- Leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa.
- Leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych (np. kaletek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebek stawowych).
- Leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń).

Przechowywanie
Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania

- uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku,
- nadwrażliwość (uczulenie) na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
- jeżeli po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ u pacjenta wystąpiły w przeszłości: pokrzywka, alergiczne zapalenie błon śluzowych nosa lub astma.

Interakcje

- Dotychczas nie odnotowano wzajemnego oddziaływania ibuprofenu miejscowo stosowanego z innymi lekami.
- Jednoczesne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększyć częstość występowania objawów niepożądanych.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.