

# InnovitumB zawiesina 4 ml

Cena: 35,18 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	INNOVITUMB
Opakowanie	4 ml
Postać	Zawiesina
Producent	CHIESI POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomaganie odporności, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Żywność
Wiek	Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka

## Opis produktu

### Opis

**InnovitumB** to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczona do stosowania w postępowaniu dietetycznym w przypadku niedokrwistości z niedoboru żelaza. Produkt ten został stworzony z myślą o wcześniakach, noworodkach (w tym o niskiej masie urodzeniowej), niemowlętach oraz dzieciach. Jest dostępny w formie zawiesiny w oleju MCT (średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe) i zawiera trzy witaminy z grupy B: B6, kwas foliowy (B9) i witaminę B12. Ze względu na swoje przeznaczenie, powinien być stosowany pod nadzorem lekarza i nie może zastępować jedyne źródła pożywienia.

Produkt jest dostępny w butelce wyposażonej w kroplomierz, co ułatwia precyzyjne odmierzenie zalecanej ilości kropli. Jedna kropla dostarcza 0,15 mg witaminy B6, 50 µg kwasu foliowego i 0,3 µg witaminy B12. Dodatkowo, jest wolny od białek mleka, laktozy oraz glutenu, co czyni go odpowiednim dla osób z nietolerancją tych składników.

### Dawkowanie

- Noworodki przedwcześnie urodzone: w profilaktyce niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemii) zaleca się podawanie 1 kropli zawiesiny na 1 kg masy ciała pacjenta na dobę.
- Niemowlęta do 6. miesiąca życia: 1 kropla na dobę.
- Niemowlęta 6.–12. miesiąc życia: 2 krople na dobę.
- Dzieci w wieku 1.–3. rok życia: 3 krople na dobę.
- Dzieci w wieku 4.–6. rok życia: 4 krople na dobę.
- Dzieci w wieku 7.–12. rok życia: 6 kropli na dobę.
- Dzieci w wieku 13.–18. rok życia: 8 kropli na dobę.

### Składniki

Olej MCT (średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe), substancja wypełniająca: mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (L-metylofolian wapnia), witamina B12 (cyjanokobalamina).

### Zastosowanie



Do postępowania dietetycznego w niedokrwistości z niedoboru żelaza u noworodków, w tym również przedwcześnie urodzonych i z małą masą urodzeniową, niemowląt i dzieci.

#### Sposób użycia

- Przed użyciem należy energicznie wstrząsać buteleczką, by uzyskać jednorodną zawiesinę.
- Odmierzoną porcję można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub rozpuścić w zimnym/ciepłym płynie (np. woda, mleko, sok owocowy).
- Można także poddawać z innym półpłynnym pokarmem o temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

#### Przeciwwskazania

- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.
- Nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia
- Nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego

#### Ostrzeżenia

- Spożyć w ciągu 30 dni do otwarcia.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

#### Producent

Chiesi Poland Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 134  
02-305 Warszawa