

Inventum 25 mg, 8 tabletek

Cena: 33,94 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	INVENTUM
Opakowanie	8 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Potencja
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Inventum to produkt leczniczy w postaci tabletek do rozgryzania i żucia, przeznaczony dla dorosłych mężczyzn w celu leczenia zaburzeń erekcji, które definiuje się jako trudności w uzyskaniu lub utrzymaniu wystarczająco silnego wzwodu umożliwiającego odbycie stosunku płciowego.

Wskazania

Lek Inventum jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu zaburzeń erekcji, definiowanych jako niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.

Działanie

Wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, prowadzące do zwiększenia napływu krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Dawkowanie

Dorośli mężczyźni: 1 tabletka (25 mg) na dobę około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.

Skład

1 tabletka zawiera:

- substancje czynną: syldenafil 25 mg (tworzącego się in situ z 35,12 mg cytrynianu syldenafilu),
- pozostałe składniki: polakrylin potasu, woda oczyszczona, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, aspartam, kroskarmeloza sodowa, aromat mięty pieprzowej, laktoza jednowodna, powidon K-30.

Przeciwwskazania

Nie należy przyjmować leku Inventum, jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku są: ciężkie choroby serca (m.in. niestabilna choroba wieńcowa, choroba niedokrwienna,



zastoinowa niewydolność serca II, III, IV w klasie NYHA); inne choroby serca jak: wada zastawkowa serca, kardiomiopatia przerostowa; ciężką niewydolność wątroby; zawał serca/udar/zaburzenia rytmu zagrażające życiu, które wystąpiły w ostatnich 6-ciu miesiącach; niskie ciśnienie tętnicze w spoczynku poniżej 90/50 mmHg; nadciśnienie tętnicze w spoczynku powyżej 170/100 mmHg; dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (relimtis pigmentosa); utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Działania niepożądane

- Bardzo często : ból głowy.
- Często: nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku należy omówić z lekarzem jeśli występują: zwiększone ryzyko wystąpienia priapizmu, anatomiczne zniekształcenie prącia, dolegliwości ze strony serca, nagłe pogorszenie widzenia.
- Leku nie stosować z innymi lekami stosowanymi w terapii zaburzeń erekcji. Nie stosować leku razem z lekami stosowanymi w nadciśnieniu płucnym.
- Nie stosować leku jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
- Nie stosować u kobiet.
- Lek zawiera laktozę.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice