

# Krople Żołądkowe z Papaweryną 35 ml

Cena: 8,23 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	35 ml
Postać	Krople
Producent	KRAKOWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" W KRAKOWIE S.A.
Przeznaczenie	Rozkurczowe, Wspomaganie apetytu, Wspomaganie trawienia
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

Krople żołądkowe z papaweryną Herbapol Kraków to lek w postaci kropli do przyjmowania doustnego. Są to tradycyjne produkty lecznicze roślinne, stosowane zgodnie z tradycją, a ich skuteczność w wskazaniach opiera się na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniach. Produkt jest dostępny w butelce ze szkła barwionego, wyposażonej w zakrętkę z kroplomierzem.

### Wskazania

Krople żołądkowe tradycyjnie stosuje się u osób dorosłych:

- w niestrawności,
- w braku łaknienia

### Działanie

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

### Dawkowanie

- Dorośli w przypadku niestrawności: doustnie, jednorazowo, ok. 2,5 ml, co odpowiada 1/2 łyżeczki preparatu w 1/4 szklanki wody (lub na cukier).
- Dorośli w przypadku braku łaknienia: ok. 2,5 ml, co odpowiada 1/2 łyżeczki preparatu w 1/4 szklanki wody (lub na cukier), 30 minut przed posiłkiem, 3-4 razy dziennie.

### Skład

100 g zawiera:

- Valerianae tinctura (1:5) (nalewka kozłkowa) – 24,9 g,
- ekstrahent - etanol 70%, Menthae pip. tinctura (1:20) (nalewka miętowa) – 24,9 g,

- ekstrahent - etanol 90%, Amara tinctura (1:5) (nalewka gorzka) – 24,9 g,
- ex: Gentianae radice, Menyanthidis folio, Auranti amari pericarpio (60,0 cz., 60,0 cz., 50,0 cz.),
- ekstrahent - etanol 70%, Hyperici tinctura (1:5) (nalewka z dziurawca) – 24,9 g,
- ekstrahent - etanol 70%, Papaverini hydrochloridum – 0,4 g.
- Produkt zawiera 67-74% obj. etanolu.
- Produkt nie zawiera substancji pomocniczych.

#### Przeciwwskazania

- Uczulenie na dowolny ze składników preparatu lub na mentol.
- Nadkwaśność, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.
- Nie stosować produktu u pacjentów z kamieniami żółciowymi i zaburzeniami dróg żółciowych.
- Nie zaleca się stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

#### Działania niepożądane

- Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
- Lek może powodować nadwrażliwość na światło słoneczne, szczególnie u osób o jasnej karnacji.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.