

# Lactulose-MIP syrop 500 ml

Cena: 33,00 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	LACTULOSUM
Opakowanie	500 ml
Postać	Syrop
Producent	MIP PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Zaparcia
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

Lactulose-MIP to lek o działaniu łagodnie przeczyszczającym.

### Wskazania

Zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej oraz zaparcia.

### Działanie

Przeczyszczające, zmniejsza stężenie amoniaku we krwi o około 25 do 50%.

### Dawkowanie

Dawkowanie powinno być dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta, ciężkości i przebiegu choroby. Laktulozę należy przyjmować doustnie. Do dawkowania syropu służy dołączona miarka. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania:

zaparcia: dorośli: 10 do 15ml syropu (6,5g do 9,75g laktulozy) 1 lub 2 razy na dobę. Dzieci: początkowo 10 do 25ml syropu (6,5g do 16,25g laktulozy) na dobę, przez 2-3 dni. Następnie 5 do 15ml (3,25g do 9,75g laktulozy) na dobę.

Encefalopatia wątrobowa: dawki należy zwiększać stopniowo. Dorośli: początkowo 10 do 15ml syropu (6,5g do 9,75g laktulozy) 3 razy na dobę, później zwiększyć 30 do 45ml (19,5 do 29,25g laktulozy) 3 lub 4 razy na dobę. Dawkowanie należy dostosować tak, żeby pacjent wydalął luźny stolec 2 do 3 razy na dobę.

### Skład

15ml syropu zawiera: 9,75g laktulozy oraz substancje pomocnicze.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lactulose-MIP:

- jeśli pacjent ma uczulenie na laktulozę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent ma niedrożność jelit;
- jeśli pacjent ma zapalenie przewodu pokarmowego;
- jeśli pacjent ma galaktozemię.

#### Ostrzeżenia

- 15 ml syropu zawiera do 2,4 g węglowodanów (m.in. fruktozę, galaktozę, laktozę), co odpowiada 0,2 jednostkom chlebowym, dlatego lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z cukrzycą.
- Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lap-pa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
- Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.