

Levopront syrop 60mg/10ml 120 ml

Cena: 27,94 zł



Opis słownikowy

| | |
|-----------------|---|
| Część ciała | Oskrzela |
| Dla kogo | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Marka | LEVOPRONT |
| Opakowanie | 120 ml (but.) |
| Postać | Syrop |
| Producent | DOMPE FARMACEUTICI SPA |
| Przeznaczenie | Kaszel, Kaszel suchy |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty |
| Wiek | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 2 lat |

Opis produktu

Opis

Levopront jest lekiem w formie syropu stosowanym na kaszel suchy. Działa poprzez hamowanie odruchu kaszlowego w drogach oddechowych. Jego wskazaniem jest objawowe leczenie nieproduktywnego kaszlu, czyli kaszlu suchego. Syrop można stosować u dorosłych oraz dzieci powyżej 2 lat.

Lek Levopront skutecznie łagodzi kaszel suchy o różnym pochodzeniu, m.in. w przypadku zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych, kaszlu w przebiegu raka płuca oraz kaszlu w przebiegu krztuśca. Substancją czynną w syropie jest lewodropropizyna, która działa przeciwkaszlowo i zmniejsza skurcz oskrzeli.

Wskazania

Objawowe leczenie kaszlu suchego (nieproduktywnego).

Działanie

Przeciwkaszlowe, znoszące skurcz oskrzeli.

Dawkowanie

- Dzieci od 2 lat (w zależności od masy ciała):

10-20 kg: 3 ml syropu trzy razy na dobę;

20-30 kg: 5 ml syropu trzy razy na dobę.

- Dorośli: 10 ml trzy razy na dobę.

Skład

10 ml syropu zawiera:

- substancję czynną: lewodropropizynę 60 mg,
- pozostałe składniki: sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, substancja poprawiająca smak i zapach wiśniowa, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenia na substancję czynną (lewodropropizynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
- U osób, u których występuje obfita wydzielina oskrzelowa i zaburzenia czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego, takie jak zespół Kartagenera i dyskineza rzęsek.
- U kobiet w ciąży, karmiących piersią lub tych, które planują zajść w ciążę.

Działania niepożądane

- pokrzywka, rumień, osutka, świąd, obrzęk naczynioruchowy,
- reakcje skórne,
- bóle żołądka, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka,
- zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drżenia, mrowienie, drętwienie,
- kołatania serca, częstoskurcz, obniżenie ciśnienia tętniczego,
- drażliwość, senność,

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przechowywanie

- Levopront, syrop na kaszel suchy należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem stosowania leku Levopront należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- Leki przeciwkaszlowe to leki objawowe i można je stosować tylko w oczekiwaniu na rozpoznanie przyczyny kaszlu i (lub) efekt leczenia choroby powodującej ten kaszel.
- Syrop należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku i w przypadku zaburzonej pracy nerek.
- Levopront zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Lek zawiera parahydroksybenzoesany, może powodować reakcje alergiczne (możliwe są reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.