

# Loratadyna Pylox 10 mg, 10 tabletek

Cena: 12,43 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	LORATADYNA
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "GALENA"
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

**Loratadyna Pylox** to lek przeciwalergiczny w postaci tabletek, przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 2 roku życia. Jest stosowany do łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, takich jak kichanie, wyciek z nosa, swędzenie, pieczenie i świąd oczu, a także obrzęk błon śluzowych. Ponadto, Loratadyna Pylox znajduje zastosowanie w łagodzeniu objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej, takich jak swędzenie i zaczerwienienie skóry. Ważne jest, że stosowanie tego leku zgodnie z zaleceniami nie wpływa negatywnie na sprawność psychomotoryczną, nie wywołuje uczucia senności ani nie działa uspokajająco.

### Wskazania

Lek Loratadyna Pylox stosowany jest w celu leczenia:

- objawów sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa,
- leczenia objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

### Działanie

Przeciwalergiczne.

### Dawkowanie

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: stosuje się dawkę w zależności od masy ciała:

- masa ciała mniejsza niż 30 kg:
- dzieci w wieku powyżej 6 lat: 5 mg (pół tabletki) raz na dobę,
- dzieci w wieku od 2 do 6 lat: nie jest wskazane stosowanie tabletek u dzieci w wieku poniżej 6 lat; u tych pacjentów zaleca się stosowanie loratadyny w postaci syropu (5 mg).
- masa ciała większa niż 30 kg: 10 mg (1 tabletki) raz na dobę.



Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabletkę) raz na dobę.

#### Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: loratadynę 10 mg,
- substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, magnezu stearynian.

#### Przeciwwskazania

Kiedy nie należy stosować leku Loratadyna Pylox:

- jeśli występuje nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

#### Działania niepożądane

Często: ból głowy, nerwowość i zmęczenie (u dzieci w wieku od 2 do 12 lat), senność (u dorosłych i młodzieży).

Niezbyt często: ból głowy, zwiększenie apetytu i zaburzenia snu u dorosłych i młodzieży.

#### Ostrzeżenia

- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.

#### Producent

GALENA  
Krucza 62  
Wrocław