

# Loratan pro 10mg 10 kapsułek



Cena: 13,04 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	LORATAN
Opakowanie	10 kapsułek
Postać	Kapsułka
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

**Loratan Pro** to lek przeciwhistaminowy dostępny w postaci płynnych kapsułek, a jego aktywnym składnikiem jest loratadyna. Mechanizm działania opiera się na hamowaniu aktywności histaminy, co sprawia, że lek działa przeciwalergicznie. Preparat jest stosowany w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. W sytuacjach, gdy niemożliwe jest wyeliminowanie czynnika uczulającego, takiego jak pyłki traw, zalecane jest stosowanie leczenia farmakologicznego. Loratan Pro łagodzi objawy alergiczne, takie jak świąd, zaczerwienienie, obrzęk oraz wodnista wydzielina z nosa, jednocześnie nie wywołując uczucia senności. Lek może być stosowany u dzieci od 6 roku życia.

### Wskazania

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

### Działanie

Przeciwalergiczne.

### Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat - 1 kapsułka (10 mg) raz na dobę.
- Dzieci od 6 do 12 lat, o masie ciała powyżej 30 kg - 1 kapsułka (10 mg) raz na dobę.

### Skład

1 kapsułka zawiera:

- substancję czynną: loratadyna 10 mg,
- substancje pomocnicze: makrogol 400, glicerol, kwas solny, woda oczyszczona; skład otoczki kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły



częściowo odwodniony, czerwień koszenilowa (E124), błękit patentowy (E131), woda oczyszczona.

#### **Przeciwwskazania**

Nie należy przyjmować leku:

- jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na loratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- u kobiet w ciąży

#### **Działania niepożądane**

Działania niepożądane występujące często: ból głowy, nerwowość, senność, zmęczenie.

Działania niepożądane występujące niezbyt często: bezsenność, zwiększenie apetytu.

#### **Ostrzeżenia**

- Lek Loratan pro zawiera sorbitol.
- Lek zawiera również czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### **Producent**

HASCO-LEK  
Żmigrodzka 242e  
Wrocław