

Loxon Max Płyn na skórę 60 ml



Cena: 61,98 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	60 ml
Postać	płyn do stos.na skór.
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu

Opis

Loxon Max to płyn przeznaczony do stosowania na skórę, który zawiera substancję czynną o stężeniu 50 mg/ml. Produkt jest dostępny w opakowaniu o pojemności 60 ml.

Loxon Max jest stosowany głównie w leczeniu różnych schorzeń skóry, takich jak łysienie plackowate (łysienie areatowe) czy łysienie androgenowe. Głównym składnikiem czynnym płynu Loxon Max jest minoksydyl, który wykazuje działanie stymulujące wzrost włosów.

Wskazania

Leczenie łysienia androgenowego u osób w wieku 18-65 lat.

Działanie

Płyn Loxon Max działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych w skórze głowy, co z kolei zwiększa ukrwienie mieszków włosowych. To przyczynia się do pobudzenia wzrostu włosów oraz ożywienia osłabionych cebulek włosowych.

Dawkowanie

Zaleca się stosowanie tego leku zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Aby prawidłowo stosować ten lek, zaleca się przyjmowanie go dwa razy na dobę. Należy nałożyć 1 ml płynu (co odpowiada średnio 10 rozpyleniom) na skórę głowy w obszarach dotkniętych łysieniem, zarówno rano, jak i wieczorem. Jedno rozpylenie równa się 0,1 ml płynu. Następnie płyn należy równomiernie rozprowadzić na obszarach łysienia i delikatnie wmasować w skórę, najczęściej na wierzchołku głowy i w zakolach czołowych. Ważne jest, aby nie przekraczać dawki 2 ml w ciągu doby, co średnio wynosi 2 razy po 10 rozpyleniach na dobę. Lek należy stosować tylko na skórę głowy.

Przed zastosowaniem leku, upewnij się, że włosy i skóra głowy są w pełni suche. Jest to istotne dla prawidłowego działania leku.

Składniki

1 ml płynu zawiera:

- substancja czynna: minoksydyl 50 mg.
- substancje pomocnicze: glikol propylenowy, etanol 96%, woda oczyszczona, kwas cytrynowy.

Przeciwwskazania

Należy unikać stosowania tego leku w przypadku:

- Uczulenia na substancję czynną lub jakiegokolwiek inny składnik leku.
- Nadciśnienia tętniczego.
- Nagłej lub niejasnej utraty włosów.
- Utraty włosów związanej z poważnymi chorobami, takimi jak zaburzenie czynności tarczycy, toczeń układowy, utrata włosów na obszarze zapalonych skóry głowy lub innych chorób.
- W przypadku, gdy skóra głowy pacjenta jest ogolona lub ma zmieniony wygląd ze względu na obecność łuszczycy, stan zapalny, zaczerwienienie, podrażnienie lub ból.
- Jeśli pacjent stosuje opatrunki okluzyjne (uszczelniające) lub stosuje inne miejscowe leki.

Interakcje

Ważne jest poinformowanie lekarza lub farmaceuty o wszystkich aktualnie lub niedawno przyjmowanych lekach oraz planowanych lekach. Należy unikać jednoczesnego stosowania tego leku z innymi lekami, które są stosowane miejscowo na skórę głowy. Istnieje ryzyko, że substancje takie jak kortykosteroidy, tretynoina, ditranol i wazelina mogą wpływać na ochronną warstwę rogowej naskórki, co może zwiększyć wchłanianie leku do krwiobiegu i spowodować ogólnoustrojowe działanie leku. Dlatego ważne jest unikanie równoczesnego stosowania tych substancji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności terapii.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku, ważne jest omówienie go z lekarzem lub farmaceutą.

- Lek należy stosować wyłącznie na miejsca łysienia na skórze głowy i należy unikać przypadkowego nałożenia na inne obszary skóry. W przypadku zabrudzenia lekiem innych części skóry, może wystąpić niepożądany wzrost włosów w tych obszarach, dlatego po zastosowaniu leku na skórę głowy należy dokładnie umyć ręce.
- Ten lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego.
- Należy go stosować tylko na zdrową skórę głowy.
- Osoby z rozpoznanymi chorobami układu krążenia lub zaburzeniami rytmu serca powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia tym lekiem.
- U niektórych pacjentów zauważono zmiany w kolorze i/lub strukturze włosów po zastosowaniu leku.
- Przekraczanie zalecanej dawki lub częstsze stosowanie leku nie przyspieszy procesu leczenia.
- Należy unikać wdychania oparów i mgiełki roztworu oraz nie połykać leku.
- Na początku leczenia (zwykle w ciągu 2-6 tygodni od rozpoczęcia) może wystąpić zwiększona utrata włosów. Jeśli utrata włosów utrzymuje się dłużej niż 2 tygodnie, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.
- Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem w przypadku niedociśnienia lub bólu w klatce piersiowej, szybkiego rytmu serca, omdlenia lub zawrotów głowy, nagłego przyrostu masy ciała, obrzęku dłoni lub stóp, oraz utrzymującego się zaczerwienienia lub podrażnienia skóry głowy.
- Ten lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat oraz u osób powyżej 65 lat.
- Należy przechowywać lek poza zasięgiem dzieci, ponieważ przypadkowe spożycie może powodować poważne działania niepożądane dotyczące serca.
- Nie należy stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią.
- Nie oczekuje się, że ten produkt będzie wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
- Lek zawiera alkohol, który może drażnić błony śluzowe i oczy. W przypadku kontaktu z oczami, należy dokładnie przemyć je wodą.

Dodatkowe informacje

Loxon Max powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z informacjami podanymi na opakowaniu. Ważne jest również przestrzeganie terminu ważności produktu oraz przechowywanie go w odpowiednich warunkach, z dala od dzieci.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943