

Maxibiotic (5 mg + 5000 UI + 400 UI)/ g, maść, 1 g x 10 saszetek



Cena: 19,24 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MAXIBIOTIC
Opakowanie	10 saszetek po 1 g
Postać	Maść
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Przeznaczenie	Antybakteryjne (przeciwbakteryjne)
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Maxibiotic to lek w postaci maści, który działa przeciwbakteryjnie i jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę w przypadku drobnych ran, owrzodzeń oraz oparzeń.

Wskazania

Drobne rany (otarcia, zadrapania, ukąszenia), oparzenia i owrzodzenia skóry.

Działanie

Przeciwbakteryjne.

Dawkowanie

Oczyszczone miejsce zranienia pokryć niewielką ilością leku, miejsce to po nałożeniu leku można przykryć opatrunkiem z gazy lub pozostawić nieosłonięte. Stosować 2 do 5 razy na dobę, nie stosować dłużej niż 7 dni.

Skład

1g maści zawiera: 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas), 5000 j.m. polimyksyny B siarczanu (Polymyxini B sulfas) oraz 400 j.m. bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum).

Substancja pomocnicza: wazelina biała.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Maxibiotic:

- jeśli pacjent ma uczulenie na neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan, bacytracynę cynkową lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku;

- jeśli pacjent ma zaburzenia słuchu (w takim przypadku po zastosowaniu leku może pojawić się działanie szkodliwe na słuch);
- na głębokie lub kłute rany, ciężkie oparzenia lub duże powierzchnie uszkodzonej skóry oraz na sączące zmiany chorobowe, ze względu na ryzyko

wchłonięcia substancji czynnych do krwi i wywołania ogólnoustrojowych działań niepożądanych (działanie szkodliwe na słuch, nerki);

- do oczu.

Działania niepożądane

- Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: zakażenie niewrażliwymi szczepami bakterii lub grzybów.
- Zaburzenia układu immunologicznego: miejscowe objawy nadwrażliwości (świąd, wysypka, zaczerwienienie, obrzęk i inne objawy podrażnienia).
- Zaburzenia ucha i błędnika: uszkodzenie słuchu.
- Zaburzenia nerek i dróg moczowych: uszkodzenia nerek.

Ostrzeżenia

- W przypadku silnych odczynów alergicznych należy przerwać leczenie.
- W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza objawów podrażnienia w miejscu nałożenia, lub w przypadku braku poprawy, należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego.
- Nie nakładać na duże powierzchnie skóry.
- Szczególnie ostrożnie należy stosować produkt leczniczy u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z upośledzeniem słuchu.

Producent

Bausch Health Poland sp. z o. o.
Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów