

# Maxigra Go 25 mg, 8 tabletek



Cena: 34,62 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	MAXIGRA
Opakowanie	8 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Potencja
Rodzaj produktu	Lek bez recepty

## Opis produktu

### Opis

Lek **Maxigra Go** zawiera substancję czynną syldenafil, stosowany jest w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn.

### Wskazania

Zaburzenia wzrodu u dorosłych mężczyzn.

### Działanie

Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

### Dawkowanie

Dorośli: 1 tabletkę na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.

### Skład

1 tabletkę powlekana Maxigra Go zawiera

- substancję czynną: syldenafil 25 mg,
- pozostałe składniki: mannitol, krospowidon typ A, powidon K-30, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol (MW350), talk, indygotyna, lak (E132).

### Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego. Stosowanie jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi chorobami serca i wątroby, niskim ciśnieniem, po niedawno przebytych udarze lub zawale, z dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa) oraz jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

## Działania niepożądane

- Bardzo często: ból głowy.
- Często: nudności; nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, zaburzenia widzenia, nadwrażliwość na światło, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

## Ostrzeżenia

- Należy omówić zastosowanie leku jeśli u pacjenta występuje: niedokrwistość sierpowata, białaczka, szpiczak mnogi, anatomiczne zniekształcenie przącia, choroba Peyroniego, dolegliwości ze strony serca, choroba wrzodowa, zaburzenia krzepnięcia oraz zaburzenia czynności nerek i wątroby.
- W przypadku nagłego pogorszenia lub utraty wzroku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

## Producent

POLPHARMA SA  
Peplińska 19  
83-200 Starogard Gdański

## Galeria



**MOC NIEBIESKIEJ  
TABLETKI** 25 mg

**DUŻE OPAKOWANIE  
WYSTARCZY NA DŁUŻEJ**

## ZOBACZ TAKŻE INNE PRODUKTY Z LINII MAXIGRA



**lepszy SEKS to lepsze ŻYCIE<sup>4</sup>**

**maxigra go**  
sildenafilum

1. Medycyna stosowana w celu leczenia erekcyjnej dysfunkcji (ED) u mężczyzn. Wykazano, że sildenafilum jest skutecznym lekiem w leczeniu ED. Sildenafilum jest lekiem z grupy inhibitorów fosfodiesterazy 5. Wykazuje on działanie na zwiększenie przepływu krwi do penisa, co prowadzi do osiągnięcia i utrzymania erekcji. Sildenafilum jest lekiem przeciwciepłym i może powodować obniżenie ciśnienia krwi. Nie należy go stosować jednocześnie z lekami przeciwciepłymi. Sildenafilum jest lekiem przeciwciepłym i może powodować obniżenie ciśnienia krwi. Nie należy go stosować jednocześnie z lekami przeciwciepłymi. Sildenafilum jest lekiem przeciwciepłym i może powodować obniżenie ciśnienia krwi. Nie należy go stosować jednocześnie z lekami przeciwciepłymi.

2. Sildenafilum jest lekiem przeciwciepłym i może powodować obniżenie ciśnienia krwi. Nie należy go stosować jednocześnie z lekami przeciwciepłymi. Sildenafilum jest lekiem przeciwciepłym i może powodować obniżenie ciśnienia krwi. Nie należy go stosować jednocześnie z lekami przeciwciepłymi. Sildenafilum jest lekiem przeciwciepłym i może powodować obniżenie ciśnienia krwi. Nie należy go stosować jednocześnie z lekami przeciwciepłymi.

3. Sildenafilum jest lekiem przeciwciepłym i może powodować obniżenie ciśnienia krwi. Nie należy go stosować jednocześnie z lekami przeciwciepłymi. Sildenafilum jest lekiem przeciwciepłym i może powodować obniżenie ciśnienia krwi. Nie należy go stosować jednocześnie z lekami przeciwciepłymi. Sildenafilum jest lekiem przeciwciepłym i może powodować obniżenie ciśnienia krwi. Nie należy go stosować jednocześnie z lekami przeciwciepłymi.

4. Sildenafilum jest lekiem przeciwciepłym i może powodować obniżenie ciśnienia krwi. Nie należy go stosować jednocześnie z lekami przeciwciepłymi. Sildenafilum jest lekiem przeciwciepłym i może powodować obniżenie ciśnienia krwi. Nie należy go stosować jednocześnie z lekami przeciwciepłymi. Sildenafilum jest lekiem przeciwciepłym i może powodować obniżenie ciśnienia krwi. Nie należy go stosować jednocześnie z lekami przeciwciepłymi.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego. bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twemu życiu lub zdrowiu.