

Maxigra Max 50 mg, 4 tabletki powlekane



Cena: 32,84 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	MAXIGRA
Opakowanie	4 tabletki
Postać	Tabletka
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Potencja
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Maxigra Max 50 mg to lek przeznaczony do stosowania u dorosłych mężczyzn, którzy borykają się z zaburzeniami erekcji, manifestującymi się trudnościami w osiągnięciu lub utrzymaniu wystarczająco silnej erekcji do przeprowadzenia udanego stosunku płciowego. Każda tabletki powlekana zawiera 50 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu, należącego do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Mechanizm działania leku opiera się na wspomaganiu rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, co sprzyja zwiększonemu przepływowi krwi podczas stymulacji seksualnej.

Wskazania

Leczenie zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn (impotencji).

Działanie

1 tabletki zawiera:

- substancję czynną: 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu),
- pozostałe składniki: rdzeń tabletki: mannitol (E421), krospowidon (typ A), powidon (K30), krzemionka, koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, talk, lak indygotyny (E132).

Dawkowanie

Dawkowanie Maxigry Max u pełnoletnich mężczyzn to max. 1 tabletki powlekana na dobę.

Skład

1 tabletki zawiera:

- substancję czynną: 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu),

- pozostałe składniki: rdzeń tabletki: mannitol (E421), krospowidon (typ A), powidon (K30), krzemionka, koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, talk, lak indygotyny (E132).

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Maxigra Max u pacjentów z uczuleniem na sildenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest ciężka choroba wątroby lub serca, niedawno przebyty udar albo zawał serca, niskie ciśnienie tętnicze krwi, pewne rzadkie choroby oka, choroby krwi.

Działania niepożądane

- Bardzo często występujące działania niepożądane: ból głowy.
- Często występujące działania niepożądane: nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem leku należy się zapoznać z informatorem dla pacjenta.
- Leku nie należy stosować częściej niż raz na dobę.
- W przypadku występowania dolegliwości sercowych czy nieprawidłowości w budowie prącia, należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Producent

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Galeria

maxigra max
50 mg tabletek powlekanych sildenafilum
4 TABLETKI powlekane
NA EREKCJE
DZIAŁA NAWET:
PO 12 MINUTACH
DO 5 GODZIN

maxigra max
40 mg tabletek powlekanych sildenafilum
4 TABLETKI powlekane
NA EREKCJE
DZIAŁA NAWET:
PO 12 MINUTACH
DO 5 GODZIN

maxigra max
20 mg tabletek powlekanych sildenafilum
4 TABLETKI powlekane
NA EREKCJE
DZIAŁA NAWET:
PO 12 MINUTACH
DO 5 GODZIN

Zyskujesz 20%²

ZOBACZ TAKŻE INNE PRODUKTY Z LINII MAXIGRA
DLA NIEGO **DLA NIEJ**

maxigra go **maxigra max** **maxigra femino** **maxigra femino**

MOC MAKSYMALNEJ DAWKI 50 mg

DUŻE OPAKOWANIE WYSTARCZY NA DŁUŻEJ

lepszy SEKS to lepsze ŻYCIE