

MAXON ACTIVE, 4 tabletki



Cena: 26,52 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	MAXON
Opakowanie	4 tabletki
Postać	Tabletka
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Przeznaczenie	Potencja
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

MaxON Active to lek, który można nabyć bez recepty i został stworzony z myślą o dorosłych mężczyznach cierpiących na impotencję, czyli zaburzenia erekcji. Jest on przeznaczony do sytuacji, gdy mężczyzna doświadcza trudności w uzyskaniu lub utrzymaniu wystarczająco silnej erekcji, umożliwiającej satysfakcjonujący stosunek płciowy. Składnik aktywny leku pomaga w osiągnięciu erekcji jedynie w przypadku wcześniejszego pobudzenia seksualnego.

Działanie

Wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Dawkowanie

Dorośli mężczyźni: zaleca się przyjmować 25 mg leku, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Skład

Substancją czynną leku jest syldenafil (Sildenafilum).

Każda tabletki zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu).

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, hydroksypropyloceluloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Skład otoczek: Ooadtv II31F58914 white: hypromeloza 15cP, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, sodu Cytrynian dwuwodny.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Maxon Active:

- jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent przyjmuje azotany lub leki uwalniające tlenek azotu, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego,

- jeśli pacjent przyjmuje riociguat,
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca lub wątroby,
- jeśli u pacjenta niedawno wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi,
- jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa),
- jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Działania niepożądane

Bardzo często: ból głowy.

Często: nudności; nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, zaburzenia widzenia, nadwrażliwość na światło, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera laktozę.
- Nie należy przyjmować leku Maxon Active razem z innymi lekami zawierającymi syldenafil.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.

Producent

Adamed Pharma S.A.
ul. M. Adamkiewicza 6A, Pieńków
05-152 Czosnów