

Maxon Forte tabletki powlekane 50 mg, 2 tabletki



Cena: 29,21 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	MAXON
Opakowanie	2 tabletki
Postać	Tabletka
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Przeznaczenie	Wspomagające sprawność seksualną, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Maxon Forte 50 mg to preparat zawierający syldenafil, substancję czynną należącą do inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Mechanizm działania leku polega na zwiększeniu przepływu krwi do prącia podczas stymulacji seksualnej poprzez rozkurcz naczyń krwionośnych w tej okolicy. W ten sposób Maxon Forte pomaga osiągnąć erekcję jedynie w przypadku wcześniejszego pobudzenia seksualnego.

Wskazania

Lek Maxon Forte 50 mg stosuje się u osób dorosłych:

- w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji.

Działanie

Lek zwiększa napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu.

Dawkowanie

Dorośli mężczyźni: zalecana dawka leku to 50 mg, jeśli pacjent przyjmował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania. W przeciwnym razie lek Maxon Forte w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu

Skład

1 tabletka zawiera:

- substancję czynną: 50 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu),
- rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna,

- otoczka tabletki Opadry II 31F58914 white: hypromeloza 15cP, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, sodu cytrynian dwuwodny.

Przeciwwskazania

- Maxon forte nie powinien być stosowany w przypadku uczulenia na substancję czynną (sildenafil) lub substancje pomocnicze.
- Przeciwwskazaniem jest również stosowanie leków z grupy azotanów, substancji uwalniających tlenek azotu (w tym tak zwanych poppersów). Leki tego typu w medycynie stosowane są do łagodzenia objawów dławicy piersiowej (ból w klatce piersiowej). Ich połączenie z sildenafilem może wywołać silny i niebezpieczny spadek ciśnienia tętniczego. W podobną interakcję wchodzi lek riociguat (stosowany w nadciśnieniu płucnym).
- Maxon Forte jest również przeciwwskazany w przypadku ciężkich chorób serca, wątroby, niedawnego przebytego udaru lub zawału serca, występowania niskiego ciśnienia tętniczego krwi, dziedzicznych zmian degeneracyjnych siatkówki lub jeśli u pacjenta kiedykolwiek wykryto utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Działania niepożądane

Bardzo często;

- ból głowy.

Często :

- nudności,
- nagłe zaczerwienienie twarzy,
- uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała),
- niestrawność,
- zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia),
- uczucie zatkanego nosa,
- zawroty głowy.

Niezbyt często:

- wymioty,
- wysypka skórna,
- podrażnienie oka,
- przekrwienie oczu,
- ból oczu,
- widzenie błysków światła,
- jaskrawe widzenie,
- wrażliwość na światło,
- łzawienie oczu,

Ostrzeżenia

- Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie wzroku lub jego utrata należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.
- Leku nie powinno się przyjmować, jeśli zaburzenia erekcji nie występują.
- Leku Maxon Forte nie powinno się łączyć razem z innymi środkami stosowanymi w leczeniu impotencji.

Producent

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów