

# Microdacyn 60 Wound Care roztw.do leczenia



Cena: 40,64 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	250 ml
Postać	-
Producent	KIKGEL MIROŚLAW KIK

## Opis produktu

### Opis

Microdacyn to roztwór ponadtlenków (superoxidised solution), który charakteryzuje się wysoką skutecznością przeciwdrobnoustrojową oraz bezpieczeństwem stosowania. Produkt ten posiada właściwości przeciwzapalne i jest hipoalergiczny. Jego działanie obejmuje szerokie spektrum drobnoustrojów, takich jak bakterie, wirusy, zarodniki i grzyby. Co istotne, Microdacyn jest bezpieczny dla zdrowych komórek, co oznacza, że nie powoduje szkody dla tkanek i komórek organizmu.

Microdacyn nie wymaga wypłukiwania z ran głębokich, co czyni go wygodnym i łatwym w użyciu. Może być stosowany do przepłukiwania ucha zewnętrznego, spojówki oka oraz tkanek takich jak więzadła i ścięgna. Dodatkowo, produkt ten niweluje nieprzyjemny zapach ran, co jest istotne dla komfortu pacjenta.

Roztwór Microdacyn jest dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej NPWT (Negative Pressure Wound Therapy), która jest wykorzystywana w leczeniu ran. Jest to technika terapeutyczna, w której rana jest pokrywana opatrunkiem, a następnie tworzony jest kontrolowany podciśnienie, co przyspiesza proces gojenia ran.

### Składniki

Woda oczyszczona, podchloryn sodu (NaOCl) – 40 ppm, kwas podchlorawy (HOCl) – 40 ppm.

### Zastosowanie

Owrodzenia, odleżyny, rany w przebiegu stopy cukrzycowej, rany oparzeniowe, rany pooperacyjne, owrodzenia nowotworowe.

### Sposób użycia

Zaaplikować preparat bezpośrednio na ranę przy pomocy nawilżonej gazy; zabieg powtarzać 2 razy dziennie na okres 15 minut oraz podczas każdej zmiany opatrunku. Nasączenie przyschniętego opatrunku preparatem Microdacyn ułatwia jego usunięcie. Nie jest konieczne dodatkowe przemywanie rany przed zastosowaniem preparatu. Microdacyn może być rutynowo stosowany zamiast soli fizjologicznej do przebywania ran pourazowych, ran oparzeniowych czy silnie zanieczyszczonych.

### Dodatkowe informacje

- Preparat Microdacyn jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego i nie powinien być stosowany do wstrzykiwań ani

spożywania.

- Jeśli występuje nadwrażliwość na składniki preparatu, należy go unikać i nie stosować.
- Preparat Microdacyn nie jest cytotoksyczny (nie toksyczny dla komórek) ani uczulający.
- Może być stosowany w ranach głębokich i nie wymaga wyflukiwania.
- Microdacyn nie powoduje uodpornienia bakterii.
- Preparat ma obojętny odczyn pH.

## Galeria

