

Minovivax 2% rozt.naskórę 0,02g/ml 1but.a1

Cena: 42,18 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 but. po 100 ml
Postać	Roztwór
Producent	AXXON SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łysienie, Wypadanie włosów
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Minovivax 2% to preparat leczniczy, który aplikuje się na skórę głowy w celu redukcji nadmiernego wypadania włosów i stymulacji ich wzrostu. Znajduje zastosowanie w łysieniu typu męskiego, skierowanym zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.

Wskazania

W leczeniu łysienia androgenowego u osób dorosłych.

Działanie

Minovivax 2% zawiera substancję czynną minoksydyl, pobudzającą wzrost włosów.

Dla uzyskania zauważalnego wzrostu włosa, konieczne może być stosowanie leku przez okres co najmniej 4 miesiące lub dłużej. Wyniki leczenia są w znacznym stopniu uzależnione od systematycznego stosowania oraz indywidualnych cech pacjenta. Maksymalny efekt działania leku uzyskuje się po około 12 miesiącach systematycznego stosowania.

Dawkowanie

Dorośli powyżej 18 lat dawkę 1 ml (sześć naciśnień pompki) produktu leczniczego Minovivax 2% należy nakładać na skórę głowy dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Nie przekraczać dawki dobowej 2 ml bez względu na wielkość powierzchni skóry objętej zmianami.

Skład

1ml płynu zawiera 20mg minoksydylu oraz substancje pomocnicze: glikol propylenowy, etanol 96%, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Minovivax 2%:

- jeśli pacjent ma uczulenie na minoksydyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- nie jest on wskazany do stosowania w leczeniu łysienia plackowatego (nagła lub niewyjaśniona utrata włosów)
- podczas leczenia cytostatyicznego (przeciwnowotworowego)
- w przypadku wypadania włosów spowodowanego stosowaniem niewłaściwej diety

- w przypadku wypadania włosów spowodowanego zakończeniem stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych
- na uszkodzona skórę głowy (np. w wyniku oparzeń, owrzodzenia lub w przypadku występowania tkanki bliznowatej)
- jeżeli wypadanie włosów zostało spowodowane przez niewłaściwą pielęgnację włosów (np. zbyt mocne wiązanie włosów)

Działania niepożądane

- Ból głowy.
- Dusznosc,
- Świąd nadmierne owłosienie (w przypadku kobiet także na twarzy), zapalenie skóry, wysypka trądzikopodobna, wysypka,
- Obrzęk obwodowy,
- Zwiększenie masy ciała.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera glikol propylenowy, ze względu na jego zawartość lek może powodować podrażnienie skóry.
- Lek zawiera również alkohol (etanol), który w razie przypadkowego kontaktu z powierzchniami wrażliwymi (oczy, błony śluzowe oraz uszkodzona skóra) może powodować uczucie pieczenia i/lub podrażnienie. W takich przypadkach, dotkniętą powierzchnię należy dokładnie i obficie spłukać bieżącą wodą. Jeśli pieczenie i/lub podrażnienie utrzymuje się należy zwrócić się po poradę do lekarza.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Należy dokładnie umyć ręce po zastosowaniu leku.
- Nie należy stosować więcej niż 2 ml leku na dobę.
- Nie należy stosować leku na inne części ciała.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

AXXON Sp. z o.o.
ul. Baletowa 30
02-867 Warszawa