

Moxalole pr.do p.rozt.doust. 20 saszetek

Cena: 27,25 zł



Opis słownikowy

Część ciała	Jelita
Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 saszetek
Postać	Proszek
Producent	MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Zaparcia
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Duphagol to lek w postaci proszku do przygotowania roztworu doustnego o smaku cytrynowym. Jest stosowany w leczeniu zaparc, co oznacza, że pomaga w regulowaniu procesu wypróżniania i zwalczaniu problemu trudności w oddawaniu stolca. Jego działanie polega na poprawie perystaltyki jelit, co ułatwia wypróżnianie. Smak cytrynowy może sprawić, że produkt jest bardziej przyjemny w użyciu.

Wskazania

Zaparcia; dla dorosłych.

Działanie

Preparat ułatwia wypróżnienie w przypadku zaklinowania stolca; zawarty w składzie makrogol 3350 zwiększa objętość masy kałowej poprzez zatrzymanie wody w jelicie, co prowadzi do normalizacji perystaltyki (pracy) okrężnicy

Dawkowanie

Zalecana dawka w przypadku zaparcia:

- Dorośli: 1 saszетка 1 do 3 razy na dobę.

Zalecana dawka w przypadku zaklinowania stolca:

- Dorośli: zazwyczaj stosuje się 8 saszetek na dobę.

Skład

1 saszетка zawiera substancje aktywne: makrogol 3350 13,125g, sodu chlorek 350,7mg, potasu chlorek 46,6mg, sodu wodorowęglan 178,5mg.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Duphagol:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na makrogol 3350, sodu chlorek, potasu chlorek, sodu wodorowęglan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli u pacjenta występują: niedrożność, perforacja lub ciężkie zapalne stany chorobowe jelit, takie jak wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna lub toksyczne rozszerzenie okrężnicy (okrężnica olbrzymia rzekoma).

Działania niepożądane

- Bóle i skurcze żołądka, biegunka, wymioty, nudności, burczenie w brzuchu i dolegliwości związane z gazami jelitowymi.

Ostrzeżenia

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Po rozpuszczeniu zawartości saszetki roztwór należy przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).
- Po upływie 6 godzin nieużyty roztwór należy wyrzucić

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.