

# Myconafine 1% krem 0,01 g/g 15 g (tuba)

Cena: 19,98 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	15 g (tub.)
Postać	krem
Producent	AXXON SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Grzybica
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

**Preparat Myconafine 1%** to krem przeciwgrzybiczny przeznaczony do miejscowego stosowania na skórę. Jest skuteczny w zwalczaniu różnych gatunków grzybów odpowiedzialnych za choroby skóry. Aktywnym składnikiem leku jest terbinafina chlorowodoru. Terbinafina wykazuje działanie grzybobójcze, co oznacza, że powoduje śmierć komórek grzybów, wobec dermatofitów i pleśni, oraz działa grzybobójczo lub grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów) w zależności od gatunku, w przypadku drożdżaków.

### Wskazania

Grzybica stóp, grzybica podeszwowa stóp, grzybica fałdów skórnych i skóry tułowia, drożdżycza skóry, łupież pstry.

### Działanie

Przeciwgrzybicze.

### Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Podanie na skórę raz lub dwa razy na dobę w zależności od wskazania:

- Grzybica stóp (z wyłączeniem podeszwy i bocznych powierzchni stóp): raz na dobę przez 1 tydzień.
- Grzybica podeszwowa stóp (obejmująca podeszwy i boczne powierzchnie stóp): 2 razy na dobę przez 2 tygodnie.
- Grzybica fałdów skórnych: raz na dobę przez 1 tydzień.
- Grzybica skóry gładkiej: raz na dobę przez 1 tydzień.
- Drożdżycza skóry: raz na dobę przez 1 tydzień.
- Łupież pstry: raz na dobę przez 2 tygodnie.

### Skład

1 g kremu zawiera:

- substancję czynną: terbinafiny chlorowodorek 10 mg,
- substancje pomocnicze: alkohol benzylowy, sorbitanu stearynian, cetylu palmitynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy,

polisorbat 60, izopropylu myrystynian, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

#### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Mycofine 1%:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na terbinafiny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

#### Działania niepożądane

- Łuszczenie skóry, świąd.
- Zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry, zmiana koloru skóry, silne zaczerwienienie, uczucie pieczenia skóry, ból, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania.
- Suchość skóry, kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk, nasilenie objawów grzybicy, podrażnienie oka (w przypadku kontaktu leku z oczami).
- Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych).
- Nadwrażliwość, wysypka.

#### Ostrzeżenia

- Lek ten jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego.
- Produkt może działać drażniąco na oczy. W przypadku kontaktu produktu leczniczego z oczami, należy przemyć je dokładnie bieżącą wodą.
- Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego, produkt może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

#### Producent

Aristo Pharma Sp. z o. o.  
ul. Baletowa 30  
02-867 Warszawa