

# Mykodermina puder leczniczy 15 g

Cena: 18,25 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	15 g
Postać	Puder leczniczy
Producent	STARPHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Grzybica
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla niemowlaka, Dla seniorów, Od 2 lat

## Opis produktu

### Opis

**Mykodermina** w formie pudru to preparat stosowany miejscowo w leczeniu różnych postaci grzybicy, takich jak grzybica drobnozarodnikowa skóry gładkiej, grzybica stóp, grzybica naskórkowa i wyprysk grzybiczy. Dodatkowo, może być używany jako leczenie wspomagające w przypadku grzybicy skóry międzypalcowej, grzybicy paznokci, drożdżyc oraz w celach profilaktycznych. Składniki aktywne leku to monoetanolamid kwasu undecylenowego i cynk undecylenian. Produkt wykazuje działanie grzybobójcze, hamujące wzrost grzybów, a w wyższych stężeniach także grzybobójcze. Działa na grzyby z rodzaju Trichophyton, Microsporium i Epidermophyton, a także na grzyby drożdżopodobne. Mykodermina wpływa na grzybnię i zarodniki.

### Wskazania

- Leczenie grzybicy drobnozarodnikowej skóry gładkiej, grzybicy stóp, grzybicy naskórkowej, wyprysku grzybiczego.
- Wspomagająco w leczeniu grzybicy skóry i szpar międzypalcowych, grzybicy paznokci, w drożdżycach.

### Działanie

Przeciwgrzybicze.

### Dawkowanie

Lek należy posypać na skórę w miejscach dotkniętych grzybicą czy zagrożonych nią zwykle 2 lub 3 razy dziennie. Po ustąpieniu objawów zakażenia należy kontynuować leczenie pudrem leczniczym Mykodermina przez minimum 4 tygodnie.

### Skład

1 g pudru zawiera:

- substancje czynne: monoetanolamid kwasu undecylenowego 30 mg, cynku undecylenian 100 mg,
- pozostałe składniki: talk.

### Przeciwwskazania



Kiedy nie należy stosować leku Mykodermina:

- jeśli pacjent ma uczulenie na monoetanolamid kwasu undecylenowego, cynku undecylenian lub talk.

#### **Działania niepożądane**

Przemijające, miejscowe podrażnienie skóry.

#### **Ostrzeżenia**

- Lek jest przeznaczony wyłącznie od użytku zewnętrznego i nie można stosować go na błony śluzowe oraz otwarte rany.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

#### **Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

#### **Producent**

Starpharma Sp. z o.o.  
ul. Stawki 2, 23 piętro  
00-193 Warszawa