

Nasometin Control 50 mikrogramów Aerozol do nosa zawiesina



Cena: 42,70 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	120 dawek (1 poj.)
Postać	Aerozol
Producent	SANDOZ GMBH
Przeznaczenie	Przeciwzapalne, Ułatwiające oddychanie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Nasometin Control 50 µg/dawkę to dostępny bez recepty lek w postaci aerozolu do nosa, zawierający miejscowo działający przeciwzapalny i przeciwalergiczny składnik aktywny. Każda aplikacja tego aerozolu dostarcza odmierzoną dawkę 50 µg substancji czynnej, którą jest mometazonu furoinian (w formie mometazonu furoinianu jednowodnego). Działa on miejscowo na błonę śluzową nosa, pomagając w złagodzeniu stanu zapalnego, który objawia się obrzękiem i podrażnieniem tej błony. Produkt ten jest dostępny bez konieczności uzyskania recepty.

Wskazania

Lek Nasometin Control stosuje się u dorosłych w wieku od 18 lat:

- w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (nazywanego również katarciem siennym).

Działanie

Lek Nasometin Control zmniejsza obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa spowodowane katarciem siennym, łagodząc w ten sposób:

- kichanie,
- świąd,
- niedrożność,
- wyciek z nosa spowodowane katarciem siennym.

Dawkowanie

Dorośli w wieku od 18 lat: Zalecaną dawką są dwa rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Skład

1 rozpylenie (100 mg) zawiera:

- substancję czynną: mometazon furoinianu (w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego) 50 µg,
- substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, karmeloza sodowa, glicerol, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, polisorbat 80, benzalkoniowy chlorek, woda do wstrzykiwań.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na mometazonu furoinian lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
- Nielezione zakażenie błony śluzowej nosa. Stosowanie leku Nasometin Control w trakcie takiego zakażenia (np. opryszczki) może pogorszyć przebieg choroby. Z zastosowaniem aerozolu do nosa należy poczekać do czasu ustąpienia zakażenia.
- Niedawno przebyte zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub uraz nosa. Nie wolno stosować aerozolu do nosa do czasu zagojenia się ran w nosie.

Działania niepożądane

Częste działania niepożądane: ból głowy, kichanie, krwawienie z nosa, ból nosa, owrzodzenie błony śluzowej nosa, zakażenie dróg oddechowych.

Ostrzeżenia

- Jeśli u pacjenta wystąpi niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy zwrócić się do lekarza.
- Długotrwałe stosowanie dużych dawek kortykosteroidów w aerozolu do nosa może spowodować wystąpienie działań niepożądanych na skutek wchłaniania się leku do organizmu.
- Jeśli pacjent odczuwa świąd lub podrażnienie oczu, lekarz może zalecić stosowanie również innych leków oprócz leku Nasometin Control.

Producent

Sandoz Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50c
02-672 Warszawa

Galeria

