

Nasometin Control 50 mikrogramów Aerozol do nosa zawiesina



Cena: 29,02 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 butelka po 60 dawek
Postać	Aerozol
Producent	SANDOZ GMBH
Przeznaczenie	Włatwiający oddychanie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Aerozol do nosa, **Nasometin Control**, zawiera kortykosteroid o miejscowym działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym. Substancją czynną jest mometazonu furoinian, należący do grupy kortykosteroidów. Działa on miejscowo na błonę śluzową nosa, pomagając w złagodzeniu stanu zapalnego, który objawia się obrzękiem i podrażnieniem. Preparat ten jest przeznaczony do leczenia objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych powyżej 18. roku życia. Katar sienny, wywołany przez pyłki drzew, traw, chwastów, a także pleśnie i zarodniki grzybów, jest diagnozowany przez lekarza. Nasometin Control redukuje obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa, łagodząc kichanie, świąd, oraz problemy z oddychaniem lub wyciekami z nosa, związane z alergicznym nieżytem nosa. Produkt ten jest wyposażony w nasadkę chroniącą końcówkę dozownika przed zanieczyszczeniem, którą należy zdjąć przed użyciem aerozolu i ponownie nałożyć po zakończonym procesie aplikacji.

Wskazania

- W leczeniu objawów stwierdzonego sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
- W celu redukcji takich symptomów kataru siennego: obrzęk, kichanie, świąd, wodnisty wyciek z nosa, polipy nosa.

Działanie

Leczenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Dawkowanie

Zalecana dawka u dorosłych w wieku od 18 lat: dwa rozpylenia aerozolu na alergię do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Skład

1ml roztworu zawiera:

- substancję czynną: 50mcg mometazonu furoinianu;

- substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, celuloza mikrokrystaliczna, karmeloza sodowa, glicerol, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, polisorbat 80, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować aerozolu do nosa na alergię Nasometin Control:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu fuorinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku na katar sienny;
- Jeśli pacjent ma nieleczone zakażenie błony śluzowej nosa bowiem stosowanie tego sprayu do nosa w trakcie infekcji (np. opryszczki) może pogorszyć przebieg choroby. Nasometin można zastosować po ustąpieniu zakażenia;
- Jeśli pacjent przebył niedawno zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub uraz nosa (nie stosować leku na katar alergiczny aż rany w nosie zagoją się).

Działania niepożądane

Częste działania niepożądane: ból głowy; kichanie; krwawienie z nosa; ból nosa; owrzodzenie błony śluzowej nosa; zakażenie dróg oddechowych.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem stosowania leku na katar alergiczny Nasometin Control należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent: choruje lub chorował w przeszłości na gruźlicę; ma jakiegokolwiek inne zakażenie; otrzymuje inne kortykosteroidy (doustnie lub w zastrzykach); choruje na mukowiscydozę.
- Podczas stosowania leku Nasometin Control należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli: układ odpornościowy pacjenta nie funkcjonuje prawidłowo (pacjent ma trudności ze zwalczeniem zakażenia), a pacjent ma kontakt z osobą chorą na odrę lub ospę wietrzną (należy unikać kontaktu z takimi osobami); pacjent ma zakażenie w obrębie nosa lub gardła; pacjent stosuje lek przez 3 miesiące bez konsultacji z lekarzem; pacjent ma utrzymujące się podrażnienie nosa lub gardła

Producent

SANDOZ
Domaniewska 50c
Warszawa

Galeria

