

Nebu-Dose Hialuronic, 30 ampułek

Cena: 32,71 zł



Opis słownikowy

Część ciała	Nos
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NEBU-DOSE
Opakowanie	30 ampułka
Postać	Ampułka
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Przeznaczenie	Katar, Podrażnienie, suchość
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Nebu-Dose Hialuronic to produkt medyczny w postaci roztworu do inhalacji, który jest przeznaczony do nebulizacji za pomocą inhalatorów pneumatycznych, mający na celu poprawę komfortu oddychania.

Preparat wykorzystuje specyficzne mechanizmy, które ułatwiają ruch wydzieliny w drogach oddechowych:

- Zmniejszenie lepkości i elastyczności wydzieliny śluzowej: Działa poprzez rozbijanie wiązań jonowych w wydzielinie, co powoduje zmniejszenie jej lepkości i elastyczności. To ułatwia jej swobodny przepływ i usunięcie z dróg oddechowych.
- Ograniczenie obrzęku ścian dróg oddechowych: Preparat absorbuje wodę z błony śluzowej, a także podśluzowej, co prowadzi do ograniczenia obrzęku ścian dróg oddechowych. To wspomaga lepsze oddychanie i komfort.
- Udrożnienie dróg oddechowych: Nebu-Dose Hialuronic pobudza mechanizmy wspierające usuwanie zalegającej w oskrzelach wydzieliny, takie jak kaszel i wykrztuszenie. Dzięki temu udrożnia drogi oddechowe i ułatwia usuwanie śluzu.

Wskazania

Nebu-dose hialuronic zalecany jest do stosowania w terapii inhalacyjnej. Szczególnie polecany jest dla pacjentów cierpiących na zapalenie oskrzeiików, ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydozę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Preparat może być również stosowany jako nośnik dla innych leków przeznaczonych do inhalacji.

Składniki

Jałowy roztwór chlorku sodu 0,9%, hialuronian sodu.

Zastosowanie

Terapia inhalacyjna jest zalecana dla pacjentów cierpiących na różne schorzenia układu oddechowego, takie jak:

- Zapalenie oskrzelików: Inhalacje mogą pomóc w łagodzeniu objawów zapalenia oskrzelików, takich jak duszność i kaszel.
- Ostre zapalenie oskrzeli: Inhalacje mogą być stosowane w leczeniu ostrego zapalenia oskrzeli, aby zmniejszyć stan zapalny i ułatwić oddychanie.
- Mukowiscydoza: Pacjenci z mukowiscydozą często korzystają z terapii inhalacyjnych, które pomagają w usuwaniu gęstej wydzieliny z dróg oddechowych.
- Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP): Terapia inhalacyjna jest jednym z głównych sposobów leczenia POChP, pomagając rozszerzyć oskrzela i ułatwić oddychanie.

Sposób użycia

- Do jednorazowej inhalacji należy używać 4 lub 5 ml roztworu, zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Po otwarciu ampułki jej zawartość należy zużyć natychmiast. Po użyciu należy ampułkę wyrzucić, by uniknąć zanieczyszczeń, które mogą stanowić źródło infekcji.
- Preparat ma optymalne zastosowanie w inhalatorach pneumatycznych. Zalecane jest przestrzeganie instrukcji użytkowania wskazanych przez producenta urządzenia.

Przeciwwskazania

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na substancje składowe preparatu, należy unikać jego stosowania. Ponadto, jeśli w trakcie używania preparatu wystąpi skurcz oskrzeli lub uporczywy kaszel, należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Jest to ważne, aby uniknąć potencjalnych powikłań lub reakcji alergicznych, które mogą być spowodowane przez składniki preparatu.

Ostrzeżenia

- Po otwarciu ampułki należy natychmiast zużyć jej zawartość - Nie przechowuj otwartej ampułki do późniejszego użycia, ponieważ może to wpłynąć na jakość i skuteczność preparatu.
- Bez konsultacji lekarskiej nie należy stosować wyrobu medycznego Nebu-Dose Hialuronic w połączeniu z innymi lekami - Istnieje ryzyko interakcji między różnymi lekami, dlatego przed zastosowaniem preparatu w połączeniu z innymi lekami zawsze warto skonsultować się z lekarzem.
- Wyrób medyczny należy podawać zgodnie z zaleceniami lekarza u pacjentów bardzo wrażliwych, ponieważ w pierwszej kolejności może być konieczne podanie leku rozszerzającego oskrzela - Dla pacjentów z wyjątkową wrażliwością lub specjalnymi warunkami zdrowotnymi, lekarz może zalecić specyficzne dawkowanie lub podawanie wyróżnionego leku.
- Należy przerwać stosowanie wyrobu medycznego i skonsultować się z lekarzem w przypadku skurczu oskrzeli bądź uporczywego kaszlu - Jeśli wystąpią nieoczekiwane reakcje, takie jak skurcz oskrzeli lub uporczywy kaszel, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.