

Nebusalin 3%, 30 ampułek



Cena: 31,29 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Nos
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 ampułek
Postać	Roztwór
Producent	OLEOFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Katar, suchość
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

3% hipertoniczny roztwór chlorku sodu jest stosowany w inhalacjach za pomocą nebulizatorów pneumatycznych lub ultradźwiękowych. Nebulizatory są urządzeniami, które zamieniają płynny roztwór na drobne kropelki, które pacjent może wdychać, co umożliwia dostarczenie leku bezpośrednio do dolnych odcinków dróg oddechowych.

Hipertoniczny roztwór działa osmotycznie, co oznacza, że posiada wyższe stężenie soli w porównaniu do naturalnych płynów w organizmie. W rezultacie roztwór ten działa obkurczająco na komórki błony śluzowej dróg oddechowych, co prowadzi do zmniejszenia obrzęku i przekrwienia. Działanie osmotyczne roztworu również pobudza wydzielanie śluzu w dolnym odcinku dróg oddechowych, co ułatwia jego usuwanie poprzez kaszel i wykrztuszanie.

Składniki

Chlorek sodu 3g, woda oczyszczona qs 100ml.

Zastosowanie

Pobudzanie usuwania wydzieliny w dolnym odcinku dróg oddechowych.

Sposób użycia

Nebulizatora należy używać zgodnie z instrukcją producenta dostarczoną z urządzeniem.

Ważne wskazówki

- Wyłącznie do jednorazowego użytku - jedna ampułka powinna być użyta tylko raz i natychmiast po otwarciu.
- Wyłącznie do inhalacji - roztwór jest przeznaczony wyłącznie do wdychania za pomocą nebulizatora.
- Nie do wstrzykiwań - produkt nie jest przeznaczony do wstrzykiwań i nie powinien być stosowany w ten sposób.
- Sprawdzanie ampułki przed użyciem - przed inhalacją należy upewnić się, że ampułka nie jest uszkodzona, aby uniknąć zastosowania zanieczyszczonego roztworu.



- Postępowanie zgodnie z instrukcjami producenta nebulizatora - ważne jest, aby stosować urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić prawidłową inhalację.
- Nadzór lekarza w przypadku duszności lub nadwrażliwości - w przypadku skłonności do duszności lub nadwrażliwości nie należy stosować roztworu bez nadzoru lekarza.
- Nie mieszać z innymi lekami - roztwór nie powinien być mieszany z innymi lekami ani dodawany do innych roztworów.