

Neosine forte Lek przeciwwirusowy i zwiększający odporność 100 ml



Cena: 27,05 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NEOSINE
Opakowanie	100 ml
Postać	Syrop
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Neosine Forte to syrop o aromacie banana, będący lekiem, który posiada właściwości przeciwwirusowe i wzmacniające odporność organizmu poprzez stymulowanie funkcji układu odpornościowego.

Wskazania

Lek Neosine Forte stosuje się u dzieci powyżej 1 roku życia i dorosłych:

- wspomagająco w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych u osób o obniżonej odporności.
- w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Działanie

Przeciwwirusowe i zwiększające odporność organizmu.

Dawkowanie

- Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): zwykle 10 ml syropu 3 lub 4 razy na dobę (0,5 ml syropu na kg masy ciała na dobę). Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeksu (czyli 40 ml syropu) na dobę.
- Dzieci w wieku powyżej 1 roku: 0,5 ml syropu na kg masy ciała na dobę. Lek należy podawać 3 razy na dobę.

Składniki

1 ml syropu zawiera:

- substancję czynną: 100 mg inozyny pranobeksu,
- pozostałe składniki: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sacharoza, sacharyna sodowa, kwas cytrynowy, sodu wodorotlenek, aromat bananowy AR 0010, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie przyjmować leku Neosine forte:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (inozyny pranobeks) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.
- jeśli pacjent miał napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego - lek może powodować przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu,
- jeśli pacjent miał kamice nerkową,
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek - podczas stosowania leku Neosine forte lekarz będzie regularnie badał krew i kontrolował pracę nerek,

nie należy stosować leku u dzieci w 1. roku życia.

Działania niepożądane

- Często: przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu; podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi; nudności z wymiotami lub bez; ból brzucha; swędzenie, wysypka skórna; ból głowy lub zawroty głowy; zmęczenie, złe samopoczucie; bóle stawów.
- Niezbyt często: biegunka; zaparcia; nerwowość; senność lub trudności w zasypianiu (bezsenna); wydalanie dużej ilości moczu (wielomocz).

Producent

UNOLAB

Galeria

