

Neosine forte Lek przeciwwirusowy i zwiększający odporność 30 sztuk

Cena: 55,37 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NEOSINE
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Obniżona odporność, Opryszczka, Przeziębienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

Neosine Forte 1000 mg to dostępny bez recepty lek przeciwwirusowy, mający również właściwości wzmacniające odporność organizmu. Jest dostępny w postaci tabletek i przeznaczony zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci powyżej 1. roku życia. Lek Neosine Forte jest skutecznym środkiem wspomagającym osoby o obniżonej odporności oraz w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Ponadto, może być stosowany w leczeniu opryszczki, która pojawia się na wargach i skórze twarzy, spowodowanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Głównym składnikiem tabletek Neosine Forte jest inozyna pranobeks, substancja aktywna, która działa hamująco na rozmnażanie się wirusów z rodziny Herpes.

Wskazania

Lek Neosine forte w tabletkach stosuje się wspomagająco:

- u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych,
- w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) (lek Neosine może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej).

Działanie

Lek Neosine Forte działa przeciwwirusowo i pobudza funkcje układu odpornościowego, przyczyniając się do zwiększenia odporności organizmu.

Dawkowanie

- Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku: zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę - zwykle 1 tabletkę 3 razy na dobę.

Nie należy przyjmować, więcej niż 4 tabletek na dobę.

- Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia: zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana na kilku dawkach podzielonych.

Leczenie zwykle trwa od 4 do 14 dni. Zaleca się, aby po ustąpieniu objawów choroby przyjmować lek jeszcze przez 1 do 2 dni.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: inozyny pranobeks (Inosinum pranobexum) 1000 mg (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3);
- pozostałe składniki: skrobia pszeniczna, mannitol, powidon 30, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.
- jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej.

Działania niepożądane

- przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego krwi,
- podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi.
- nudności lub wymioty,
- ból brzucha,
- swędzenia wysypka skórna,
- ból głowy lub zawroty głowy,
- zmęczenie, złe samopoczucie,
- bóle stawów.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli pacjent miał napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego, jeśli pacjent miał kamieć nerkową, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek.
- Lek zawiera skrobię pszeniczną, leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż celiakia).
- Lek Neosine forte mogą stosować pacjenci z celiakią.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

