

Nifuroksazyd 100mg, 24 tabletek

Cena: 7,73 zł



Opis słownikowy

Część ciała	Jelita
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	24 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Biegunka
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Nifuroksazyd 100 Hasco to lek przeciwbakteryjny stosowany w leczeniu biegunek o podłożu bakteryjnym. Jest to lek, który działa na niektóre rodzaje bakterii odpowiedzialnych za infekcje przewodu pokarmowego. Nifuroksazyd działa w jelicie, hamując rozwijanie się i namnażanie bakterii, co pomaga w kontrolowaniu infekcji bakteryjnych i skraca czas trwania biegunek.

Działanie

Nifuroksazyd wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących zakażenia jelitowe. Nie zaburza prawidłowej równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego. Nifuroksazyd działa szybko, wyłącznie w świetle jelit, nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie wywiera działania ogólnego. Jest szybko wydalany z organizmu.

Dawkowanie

- Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.
- Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 600 do 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Skład

Substancją czynną jest nifuroksazyd (Nifuroksazydum).

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian oraz otoczka (Opadry II HP 85F22064 Yellow) o składzie: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, lak aluminiowy żółcieni chinolinowej E104, talk, tytanu dwutlenek, żółcień pomarańczowa E110, lak aluminiowy indygo-karminy E132.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nifuroksazyd 100 Hasco:



- jeśli pacjent ma uczulenie na nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia

- Podczas leczenia niezbędne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów.
- Jeśli biegunka utrzymuje się po 2 lub 3 dniach leczenia lub w przypadku nasilenia biegunki podczas stosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nifuroksazyd 100 Hasco zawiera żółcień pomarańczową, która może powodować reakcje alergiczne.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.