

# NiQuitin Preparat pomagający rzucić palenie stopień 1 7 sztuk



Cena: 86,59 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NIQUITIN
Opakowanie	7 plast. (po 22 cm2)
Postać	plaster
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Palenie, Uzależnienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

NiQuitin Przezroczysty to produkt leczniczy w postaci plastrów, które przykleja się na skórę. Plastry te mają na celu pomóc w pokonaniu uzależnienia od tytoniu.

Plastry z nikotyną zmniejszają uczucie głodu nikotynowego i łagodzą objawy odstawienia papierosów. Każdy plaster dostarcza 21 mg czystej nikotyny, uwalniając ją stopniowo przez 24 godziny, co pomaga zminimalizować nieprzyjemne skutki rzucenia palenia. Ważne jest, że plastry te nie wydzielają szkodliwych substancji, które są obecne podczas spalania tytoniu.

### Wskazania

Nikotynowa terapia zastępcza łagodząca objawy wynikające z odstawienia nikotyny, takie jak uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (ból głowy, ból mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu.

### Działanie

Łagodzenie objawów wiązanych z odstawieniem nikotyny.

### Dawkowanie

Dorośli:

- stopień 1: plastry 21 mg stosować przez 6 tygodni,
- stopień 2: plastry 14 mg stosować przez 2 tygodnie,
- stopień 3: plastry 7 mg stosować przez 2 tygodnie.

### Skład

1 plaster o powierzchni 22 cm<sup>2</sup> do stosowania na skórze zawiera:

- substancję czynną: nikotynę (Nicotinum) 114 mg (plaster dostarcza 21 mg w ciągu 24 godzin),
- pozostałe składniki: kopolimer etylenowinylooctanu, polietylenu tereftalan/etylenowinylooctan, wysokiej gęstości film polietylenowy, lepki laminat poliizobutylenowy, film poliestrowy, biały atrament.

#### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku NiQuitin:

- jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u dzieci.

#### Działania niepożądane

- reakcje skórne w miejscu zastosowania plastra,
- zaburzenia snu,
- nudności i/lub wymioty
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- kołatanie serca.

#### Ostrzeżenia

- Osoby uzależnione od palenia tytoniu, które niedawno przebyły zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu, chorujące na niestabilną lub nasilającą się dławicę piersiową lub nocną postać dławicy piersiowej, ciężkie zaburzenia rytmu serca powinny próbować rzucić palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej, chyba, że lekarz zezwoli na jej stosowanie.
- Osoby chore na cukrzycę, stosujące tabletki NiQuitin MINI, powinny mierzyć stężenia cukru we krwi częściej niż zwykle. Zalecenia dotyczące przyjmowania insuliny lub leków przeciwcukrzycowych mogą ulec zmianie.
- Osoby, u których kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna obejmująca obrzęk ust, twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub swędząca wysypka na skórze (pokrzywka) powinny zachować ostrożność. Stosowanie nikotynowej terapii zastępczej może czasami spowodować takie reakcje.
- Osoby posiadające dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny zachować ostrożność stosując tabletki NiQuitin MINI, ponieważ stężenie nikotyny dostarczanej podczas stosowania nikotynowej terapii zastępczej jest nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nikotyna wpływa na dzieci silniej niż na dorosłych. Może spowodować u dzieci ciężkie, śmiertelne zatrucie.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

#### Producent

Perrigo Poland Sp. z o.o.  
Al. Niepodległości 18  
02-653 Warszawa