

# Nurofen dla dzieci Forte Zawiesina doustna o smaku truskawkowym 100 ml



Cena: 37,70 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	NUROFEN
Opakowanie	100 ml (but.)
Postać	Zawiesina doustna
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Dla młodzieży

## Opis produktu

### Opis

Nurofen Forte dla dzieci to lek w postaci truskawkowej zawiesiny doustnej, należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Zalecany jest w sytuacjach gorączki oraz umiarkowanego bólu różnego pochodzenia. Dodatkowo, może być używany jako wsparcie w leczeniu stanów zapalnych ucha środkowego. Substancją czynną tego preparatu jest ibuprofen.

### Wskazania

Nurofen dla dzieci Forte stosuje się od 3. miesiąca życia (od 5 kg) do 12 roku życia (do 40 kg) w krótkotrwałym, objawowym leczeniu:

- gorączki,
- bólu o nasileniu małym lub umiarkowanym.

### Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz przeciwzapalne.

### Dawkowanie

- dzieci o masie ciała od 5 kg (3-5 miesięcy): 1,25 ml 3 razy na dobę co 6-8 godzin, maksymalna dobową dawką ibuprofenu to 150 mg;
- dzieci o masie ciała 7-9 kg (6-11 miesięcy): 1,25 ml 3-4 razy na dobę co 6-8 godzin, maksymalna dobową dawką ibuprofenu to 150-200 mg;
- dzieci o masie ciała 10-15 kg (1-3 lata): 2,5 ml 3 razy na dobę co 6-8 godzin, maksymalna dobową dawką ibuprofenu to 300 mg;
- dzieci o masie ciała 16-19 kg (4-5 lat): 3,75 ml 3 razy na dobę co 6-8 godzin, maksymalna dobową dawką ibuprofenu to 450 mg;
- dzieci o masie ciała 20-29 kg (6-9 lat): 5 ml 3 razy na dobę co 6-8 godzin, maksymalna dobową dawką ibuprofenu to 600 mg;

- dzieci o masie ciała 30-40 kg (10-12 lat): 7,5 ml 3 razy na dobę co 6-8 godzin, maksymalna dobową dawką ibuprofenu to 900 mg.

### Składniki

1 ml zawiesiny doustnej zawiera:

- substancję czynną: ibuprofen (Ibuprofenum) 40 mg,
- substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharyna sodowa, polisorbit 80, bromek domifenu, maltitol ciekły, glicerol, guma ksantanowa, aromat pomarańczowy 2M16014 (skrobia modyfikowana, guma arabska, maltodekstryna, naturalne i identyczne z naturalnymi substancje aromatyczne) i woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nurofen dla dzieci Forte:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ),
- jeśli kiedykolwiek wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związana z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ,
- jeśli obecnie występuje lub występowało owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (choroba wrzodowa) lub krwawienie (dwa lub więcej potwierdzone przypadki owrzodzenia lub krwawienia),
- jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca,
- jeśli występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne czynne krwawienie,
- jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, ponieważ ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia,
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu.

### Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane:

- zgaga,
- bóle brzucha,
- nudności,
- niestrawność,
- biegunka,
- wymioty,
- wzdęcia,
- zaparcia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

- reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem,
- równe wysypki skórne,
- zaburzenia widzenia,
- bóle głowy,
- zawroty głowy,
- bezsenność,
- pobudzenie,
- drażliwość lub zmęczenie.

Rzadko występujące działania niepożądane:

- szumy uszne,
- zmniejszenie stężenia hemoglobiny,
- zwiększenie stężenia mocznika we krwi,
- zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

### Ostrzeżenia

- Jeśli dziecko przeżyło ostatnio poważny zabieg chirurgiczny,



- Jeśli dziecko jest odwodnione, ze względu na zwiększone ryzyko niewydolności nerek u dzieci odwodnionych.
- Jeśli u dziecka występowało lub występuje astma lub choroby alergiczne, które mogą powodować duszność.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**Producent**

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE  
Dansom Lane  
Hull HU8 7DS, UK